КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Вопросы программы для рубежного контроля 1

Дисциплины: «Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях»
Код дисциплины: PDPPNS 1301
Шифр и наименование ОП: 6В10106 «Фармация»
Объем учебных часов (кредитов): 90 часов (3 кредита)
Курс и семестр изучения: 1 курс, 2 семестр

Составитель: ассистент кафедры, Оразбаева Э.А.

Хаттама № «11» «26» 06 2025ж.

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент _____ Сейдахметова А.А

«Первая доврачебная помощь» РК – 1

1 - вариант

1. В объем первой медицинской помощи входит:
   a) переливание крови и кровезаменителей
   b) первичная хирургическая обработка ран
   c) временная остановка наружного кровотечения
   d) ушивание сосуда на протяжении
   e) наложение сосудистого шва
2. Признакам эффективности реанимационных мероприятий являются:
   a) расширение зрачков
   b) сужение зрачков
   c) появления положительного симптома «кошачьего глаза»
   d) понижение температуры тела
   e) отсутсвие артериального давления
3. К мягким повязкам относятся:
   a) Бинтовые
   b) пластмассовые
   c) клеевые
   d) крахмальные
   e) Гипсовые
4. К твердым повязкам относятся:
   a) эластичные
   b) бинтовые
   c) Гипсовые
   d) контурные
   e) сетчато-трубчатые
5. При проведении искусственного дыхания запрокидыватьголову больного необходимо для:
   a) удобства реаниматора
   b) герметизаций между ртом врача и ртом пациента
   c) создания лучших условий для кровообращения
   d) удобства больного
   e) обеспечения проходимость дыхательных путей
6. Тройной прием Сафари для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей включает... .
   a) под лопатки подложен валик, голова отогнута кзади, нижняя челюсть выдвинута вперед
   b) положение на спине, голова повернута на бок, нижняя челюсть выдвинута вперед
   c) положение на спине, голова согнута кпереди, нижняя челюсть прижата к верхней
   d) положение на спине, под лопатки подложен валик, нижняя челюсть прижата к верхней
   e) положение на животе, голова согнута кпереди, нижняя челюсть прижата к верхней
7. Пострадавший неподвижен, на оклик не реагирует. Видимое дыхание и пульс на лучевой артерии отсутствует. Пульс на сонной артерии едва определяется. Для обеспечения проходимости дыхательных путей при выполнении тройного приема Сафара необходимо в первую очередь ... .
   a) создать возвышенное положение головы

b) выдвинуть нижнюю челюсть вперед и открыть рот
c) осмотреть и очистить полость рта пострадавшего
d) запрокинуть голову назад
e) вставить воздуховодную трубку

8. При осмотре больного сознание отсутствует, зрачки расширены, реакция на свет отсутствует, АД – 50/20 мм рт.ст., пульс нитевидный, редкий, дыхание поверхностное, замедленное, температура тела понижена, судороги, непроизвольное мочеиспускание. Для стадии терминального состоянияхарактерны эти симптомы:
a) терминальная
b) предагональная
c) клиническая смерть
d) агональная
e) биологическая смерть

9. Пострадавший сидит на земле, состояние удовлетворительное, он указывает на рану в средней трети голени, рана глубокая, с неровными рваными краями, из раны вытекает кровь темно – вишневого цвета. Мероприятие должно быть выполнено в первую очередь на данном этапе:
a) измерение АД
b) эвакуировать из очага в положении лежа под наблюдением
c) первичная обработка раны
d) наложение асептической давящей повязки
e) внутримышечное введение анальгетиков

10. Пострадавший лежит на спине, кожа и слизистые бледные, лоб холодный, влажный; дыхание частое, на левой верхней конечности, чуть выше локтя одежда разорвана, видна рана, из которой толчками изливается кровь алого цвета. Пострадавший возбужден, пытается встать, функция конечности не нарушена. Мероприятие должно быть выполнено в первую очередь на данном этапе:
a) пальцевое прижатие плечевой артерии в нижней трети плеча
b) наложение асептической повязки
c) эвакуировать из очага в положении лежа
d) перед транспортировкой дать горячее сладкое питье, согреть его
e) наложение жгута

11. Пострадавший лежит на спине, глаза закрыты; дыхание тяжелое, редкое; кожа и слизистые бледные; обе голени повреждены, видны многочисленные кровоточащие ссадины; оба голеностопных сустава неестественно вывернуты наружу, пульс еле пальпируется, частый и слабый; на ваших глазах пострадавший перестает дышать, пульс исчезает. Доврачебная помощь должны проводиться по отношению к данному пострадавшему:
a) провести иммобилизацию подручными средствами
b) эвакуировать из очага в положении лежа под наблюдением
c) проведение сердечно – легочной реанимации
d) наложение асептической повязки
e) внутримышечное введение анальгетиков

12. Местными признаками раны являются:
a) зуд кожи
b) зияние дефекта кожи или слизистой
c) покраснение кожи
d) пузыри, заполненные желтой жидкостью

e) бледность кожи

13. Возможными осложнениями раны являются:
a) внезапная остановка дыхания и сердца
b) гипертензия
c) кома (длительная потеря сознания)
d) анемия
e) многократная рвота

14. Какая рана чаще всего неосложняются развитием инфекционного воспаления:
a) колотые
b) резаные
c) рубленые
d) ушибленные
e) рваные

15. Какие раны лучше всего заживают:
a) резаные
b) рубленые
c) ушибленные
d) рваные
e) укушенные

16. При каких ранах чаще всего остаются незамеченными повреждения глубжележащих органов (сосудов, нервов, внутренних органов):
a) колотые
b) резаные
c) рубленые
d) ушибленные
e) рваные

17. Нарушение анатомической целостности покровных или внутренних тканей на всю их толщину, а иногда также и внутренних органов, вызванное механическим воздействием – это:
a) рана
b) перелом
c) кровотечение
d) травма
e) ожог

18. Кровотечение, характеризующееся вытеканием крови пульсирующей струёй, имеющей алую окраску:
a) артериальное
b) венозное
c) паренхиматозное
d) капиллярное
e) смешанное

19. Истечение крови из поврежденных кровеносных сосудов - это:
a) кровоизлияние
b) кровотечение
c) травма
d) рана
e) гематома

20. Кровотечение, характеризующееся непрерывным вытеканием крови, имеющей темный цвет:
a) артериальное
b) венозное
c) капиллярное
d) паренхиматозное
e) смешанное

21. Как остановить венозное кровотечение?
a) наложить давящую повязку
b) наложить жгут
c) обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой
d) продезинфицировать спиртом и обработать йодом
e) пальцевое прижатие

22. Как проверить наличие дыхания у ребенка при внезапной потери сознания:
a) в течение 10 секунд внимательно смотреть на его грудную клетку
b) запрокинуть голову ребенка, поднять подбородок, в течение 10 секунд прислушиваться, пытаться ощутить дыхание ребенка на своей щеке, увидеть дыхательные движения его грудной клетки
c) наклониться к ребенку, приложить ухо к его грудной клетке и в течение 10 секунд прислушиваться
d) в течение 10 секунд внимательно смотреть на брюшную полость

23. Что делать, если ребенок подавился и не может дышать, говорить и кашлять (найдите ошибку):
a) выполнить толчки в верхнюю часть живота (детям до года –в грудь) до 5 попыток, если традиционные удары по спине не помогли
b) если удары в спину и толчки в верхнюю часть живота не помогли,уложить ребенка на пол, проверить признаки дыхания, при их отсутствии вызвать скорую медицинскую помощь и приступить к сердечно-легочной реанимаци
c) ударить по спине между лопатками (до 5 попыток), наклонив ребенка вперед
d) сразу надо сделать коникотомию

24. Ранним симптомом биологической смерти является:
a) появление симптома «кошачьего глаза»
b) трупное окоченение
c) положительная реакция на свет
d) сужение зрачков
e) положительный корнеальный рефлекс

25. Максимальная длительность клинической смерти в обычных условиях составляет до... минут.
a) 10
b) 20
c) 5
d) 15
e) 30

2 - вариант

1. Ранним симптомом биологической смерти является:
a) появление симптома «кошачьего глаза»
b) трупное окоченение

c) положительная реакция на свет
d) сужение зрачков
e) положительный корнеальный рефлекс

2. Максимальная длительность клинической смерти в обычных условиях составляет до... мин.
a) 10
b) 20
c) 5
d) 15
e) 30

3. К временной остановке кровотечения относятся:
a) перевязка сосуда в ране
b) введение препаратов способствующих повышению свертывности крови
c) наложение сосудистого шва
d) диатермокоагуляция
e) наложение жгута выше раны

4. Наложение жгута считается правильным ... .
a) синюшности кожного покрова
b) при исчезновении пульса на артерии ниже уровня жгута
c) при отсутствии чувствительности кожи ниже уровня наложения жгута
d) при повышении местной температуры кожи ниже жгута
e) при гиперемии кожного покрова

5. Характерный признак внутреннего кровотечения:
a) повышение артериального давления
b) гиперемия кожи
c) брадикардия
d) бледность кожи
e) экспираторная одышка

6. При выполнении коникотомии с целью экстренного восстановления проходимости дыхательных путей производят:
a) поперечное рассечение тканей между перстневидными и щитовидными хрящами
b) продольное рассечение перстневидного хряща
c) поперечное рассечение перстневидного хряща
d) продольное рассечение 1-го и 2-го колец трахеи
e) продольное рассечение тканей между перстневидным хрящом и 1-м кольцом трахеи

7. При осмотре пострадавшего: сознание отсутствует, кожные покровы бледные, холодные на ощупь, зрачки расширены, реакция на свет отсутствует. Пульс на сонных артериях не определяется, дыхание отсутствует. Для состояния характерна данная клиническая картина:
a) предагональная
b) терминальная
c) агональная
d) биологическая смерть
e) клиническая смерть

8. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку одним лицом на… .
a) 3 вдоха - 4 компрессий

b) 2 вдоха - 30 компрессий
c) 1 вдох - 5 компрессий
d) 2 вдоха - 4 компрессий
e) 3 вдоха - 6 компрессий

9. Характерный признак артериального кровотечения:
a) истечение крови алой пульсирующей струей
b) истечение крови постоянной струей
c) медленное истечение крови (каплями)
d) всей раневой поверхностью
e) истечение крови прерывистой струей

10. Незначительно кровоточит раневая поверхность при ... кровотечении.
a) артериальном
b) паренхиматозном
c) капиллярном
d) венозном
e) абдоминальном

11. К характерным признакам венозного кровотечения относятся:
a) истечение крови пульсирующей струей алого цвета
b) истечение крови постоянной струей темно-вишневого цвета
c) медленное истечение крови (каплями)
d) кровоточивость всей раневой поверхности
e) истечение крови пульсирующей струей темно-вишневого цвета

12. Возможным осложнением укушенных ран является:
a) Сибирская язва
b) Гепатит
c) Бешенство
d) Чума
e) Дизентерия

13. Возможным осложнением всех случайных ран (в случае загрязнения почвой) является:
a) Сибирская язва
b) Гепатит
c) Дизентерия
d) Брюшной тиф
e) Столбняк

14. При ранении сонной артерии необходимо срочно:
a) наложить тугую повязку
b) наложить жгут
c) зажать пальцем артерию ниже раны
d) зажать пальцем артерию выше раны
e) обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой

15. Артериальное кровотечение возникает:
a) при повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении
b) при поверхностном ранении
c) при неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов
d) при повреждении вены
e) при повреждении капилляров

16. Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной конечности главным образом применяется при:

a) внутреннем кровотечении
b) поверхностных ранениях
c) любых ранениях конечности
d) глубоких ранениях
e) артериальном кровотечении

17. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является:
a) наложение давящей повязки
b) пальцевое прижатие
c) максимальное сгибание конечности
d) наложение жгута
e) возвышенного положения конечности

18. В какой последовательности следует осматривать ребенка при его травмировании:
a) Голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности
b) Грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности
c) Конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова
d) Живот, грудная клетка, шея, голова, конечности
e) Голова, конечности, шея, живот и область таза, грудная клетка

19. Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку?
a) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком
b) только медицинский работник
c) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии специальной подготовки и (или) навыков
d) только сотрудники скорой помощи
e) любой человек, при наличии специальной подготовки и (или) навыков

20. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в первую очередь:
a) обработать край раны йодом
b) провести иммобилизацию конечности
c) промыть рану перекисью водорода
d) остановить кровотечение
e) максимальное сгибание конечности

21. Кровотечение, возникающее через 5 суток после травмы называется ... .
a) первичным
b) вторичным ранним
c) вторичным поздним
d) скрытым
e) первичным поздним

22. Основное осложнение, возникающее при проведении непрямого массажа сердца:
a) перелом ключицы
b) повреждение трахе
c) перелом ребер
d) перелом позвоночника
e) перелом грудины

23. Основным признаком остановки сердца является:
a) отсутствие самостоятельного дыхания
b) широкие зрачки
c) отсутствие сознания

d) отсутствие пульса на сонной артерии
e) отсутствие пульса на лучевой артерии

24. Характерным признаком внутреннего кровотечения является:
a) бледность кожных покровов
b) повышение температуры тела
c) брадикардия
d) гиперемия кожи
e) повышение артериального давления

25. Правильным приемом остановки носового кровотечения на догоспитальном этапе оказания помощи является:
a) передняя тампонада полости носа и наклон головы пострадавшего вперед
b) прижатие крыльев носа к носовой перегородке и наклон головы пострадавшего назад
c) наложение холода на область наружного носа и наклон головы пострадавшего назад
d) задняя тампонада полости носа
e) наложение пращевидной повязки

3 - вариант

1. Показания к прекращению реанимации:
a) отсутствие признаков эффективного кровообращения
b) отсутствие самостоятельного дыхания
c) появление признаков биологической смерти
d) широкие зрачки
e) бледность кожных покровов

2. Травмы кожи, тканей, органов без нарушения целостности кожи:
a) ушиб
b) перелом
c) ожог
d) обморожение
e) рана

3. Нарушения целостности костей:
a) ушиб
b) перелом
c) ожог
d) обморожение
e) вывих

4. Перелом, сопровождающийся повреждением не только кости, но и кожи:
a) простой
b) частичный
c) открытый
d) закрытый
e) полный

5. Шину НЕ накладывают при переломе:
a) голени
b) плечевой кости
c) грудной клетки
d) бедра

e) руки

6. Пузыри на припухлой покрасневшей коже – признак ожога:
   a) 1 степени
   b) 2 степени
   c) 3А степени
   d) 4 степени
   e) 3Б степени
7. Перегревание организма это:
   a) тепловой удар
   b) солнечный удар
   c) загорание
   d) ожог
   e) повышение температуры тела
8. При химическом ожоге необходимо пораженное место:
   a) промыть большим количеством проточной водой
   b) смазать кремом
   c) обработать йодом
   d) наложить повязку
   e) обработать спиртом
9. Если больной потерял сознание, остановилось дыхание, пульс не прощупывается, то срочно делается:
   a) звонок в пункт скорой помощи
   b) укол
   c) искусственное дыхание и непрямой массаж сердца
   d) транспортировка пострадавшего в больницу
   e) прекардиальный удар
10. Первая доврачебная помощь при отравлении некачественной пищей:
   a) звонок в пункт скорой помощи
   b) промывание желудка
   c) принять таблетку
   d) транспортировка пострадавшего в больницу
   e) сделать клизму
11. При проведении искусственного дыхания запрокидывать голову больного необходимо:
   a) для удобства реаниматора
   b) для герметизаций между ртом врача и ртом пациента
   c) обеспечения проходимость дыхательных путей
   d) в целях создания лучших условий для кровообращения
   e) для удобства больного
12. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой медицинской помощи» при ДТП:
   a) Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст
   b) Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили.
   c) Указать место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить: количество пострадавших, их пол, примерный возраст, наличие у них сознания, дыхания, кровообращения, а также

сильного кровотечения, переломов и других травм. Дождаться сообщения диспетчера о том, что вызов принят

13. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации:

a) Основания ладоней обеих кистей, взятых в «замок», должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча. Руки выпрямляются в локтевых суставах.
b) Основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки на два пальца выше мечевидного отростка, вторую руку накладывают сверху, пальцы рук берут в замок. Руки выпрямляются в локтевых суставах, большие пальцы рук указывают на подбородок и живот. Надавливания должны проводиться без резких движений
c) Давление руками на грудину выполняют основанием ладони одной руки, расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Рука выпрямлена в локтевом суставе. Направление большого пальца не имеет значения.

14.Какую оптимальную позу следует придать пострадавшему, находящемуся в сознании, при подозрении на травму позвоночника:

a) Уложить пострадавшего на бок
b) Уложить пострадавшего на спину на твердой ровной поверхности, без необходимости его не перемещать, позу не менять
c) Уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги

15.Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части головы:

a) Остановить кровотечение прямым давлением на рану и наложить давящую повязку. При потере сознания придать устойчивое боковое положение. По возможности, приложить к голове холод
b) Фиксировать шейный отдел позвоночника с помощью импровизированной шейной шины (воротника). На рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности, к голове приложить холод
c) Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уложить на бок

16.Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии дыхания и кровообращения для оказания первой помощи?

a) На спину с подложенным под голову валиком
b) На спину с вытянутыми ногами
c) Придать пострадавшему устойчивое боковое положение, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой

17.Как определить наличие дыхания у потерявшего сознание пострадавшего?

a) Взять пострадавшего за подбородок, запрокинуть голову и в течение 10 секунд проследить за движением его грудной клетки
b) Положить одну руку на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой поднять подбородок и, запрокинув голову, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд прислушаться к дыханию, постараться ощутить выдыхаемый воздух своей щекой, проследить за движением грудной клетки

c) Не запрокидывая головы пострадавшего, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд прислушаться к дыханию, почувствовать его своей щекой, проследить за движением его грудной клетки

18.Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего?

a) Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз
b) Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот.
c) Встать сбоку от пострадавшего, поддерживая его одной рукой под грудь, второй рукой наклонить корпус пострадавшего вперед головой вниз. Нанести пять резких ударов основанием ладони в область между лопаток. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками чуть выше пупка, сцепить свои руки в замок и пять раз резко надавить на область живота в направлении внутрь и кверху.

19. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и с чего начинается первая помощь при ее ранении?

a) Кровь темного цвета вытекает из раны медленно. На рану накладывается давящая повязка, с указанием в записке времени наложения повязки
b) Кровь ярко-алого цвета вытекает из раны пульсирующей или фонтанирующей струей. Артерия прижимается пальцами, затем в точках прижатия выше раны, максимально близко к ней, накладывается кровоостанавливающий жгут с указанием в записке времени наложения жгута
c) Кровь вытекает из раны медленно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения, с указанием в записке времени наложения жгута.

20. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи?

a) Разрешено
b) Разрешено в случае крайней необходимости
c) Запрещено

21.Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий?

a) Наложить давящую повязку на место ранения
b) Наложить жгут выше места ранения
c) Наложить жгут ниже места ранения

22. Каковы первоначальные действия при оказании первой помощи в случае ранения, полученного в результате ДТП?

a) Промыть рану водой, удалить инородные тела, внедрившиеся в рану, приложить стерильную вату, закрепив ее бинтовой повязкой
b) Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью и заклеить сплошным лейкопластырем
c) Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой

23. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?

a) Уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность, запрокинуть ему голову, положить одну руку на лоб, приподняв подбородок двумя пальцами другой руки
b) Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. При наличии слизи и рвотных масс очистить от них ротовую полость.
c) Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. При наличии слизи и рвотных масс очистить от них ротовую полость.

24. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего?
a) Искусственное дыхание и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину
b) Давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание: вначале 15 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту»
c) Давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту»

25. Какова первая помощь при наличии признаков поверхностного термического ожога (покраснение и отек кожи, образование на местеожога пузырей, наполненных прозрачной жидкостью, сильная боль)?
a) Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать
b) Вскрыть ожоговые пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить пострадавшего водой

Вопросы программы для рубежного контроля 2
«Первая доврачебная помощь» РК – 2

1. Индекс Франка, позволяющий установить и определить степень ожогового шока, является произведением:
а) глубины ожога и площади его
б) области поражения и площади его
в) глубины ожога и возраста больного
г) температуры, вызывающей ожог, и локализации поражения
д) пола пострадавшего и его возраста
2. По классификации Т.Я.Арьева местные проявления отморожения делятся:
а) на 5 степени
б) на 3 степени
в) на 2 степени
г) на 4 степеней
д) на 6 степеней
3. Наиболее часто холодом бывают поражены:
а) ягодицы
б) лицо
в) конечности (кисть, стопа)
г) живот
д) грудная клетка
4. Для истинного утопления в морской воде характерно:
а) гемоконцентрация, гиповолемия
б) гиперволемия, гемодилюция
в) гиперволемия, гемоконцентрация
г) гемодилюция, гиповолемия

д) гемодилюция, гемоконцентрация
5. Асфиксическое утопление наступает в результате:
а) судорожные симптомы
б) эмоционального стресса
в) попадания массивного количества воды в легкие
г) воздействия низкой температуры воды
д) спазма голосовой щели
6. Клинически "синкопальное" утопление характеризуется наличием
а) агонального периода
б) первичной остановки сердца (кровообращения)
в) первичного ларингоспазма
г) первичной черепно-мозговой травмы, перелома шейного отдела позво-ночника
д) первичной остановки дыхания
7.К видовым признакам странгуляционной асфиксии относят :
а) овальные кровоподтеки и дугообразные ссадины на коже шеи
б) кровоподтеки и дугообразные ссадины на коже запястий
в) разлитые, насыщенные трупные пятна
г) цианоз лица
д) отек Квинке
8. К … приводит сдавливание сонных артерий при повешении.
а) повышению давления в системе верхней полой вены
б) острому венозному полнокровию внутренних органов
в) острому кислородному голоданию сердечной мышцы
г) острому кислородному голоданию головного мозга
д) внутреннему кровотечению
9. При получение теплового удара:
а) опустить в холодную воду
б) укрыть теплым полотенцем
в) перенести пострадавшего в прохладное место
г) пытаться напоить водой в бессознательном состоянии пострадавшего
д) дать попить холодной воды
10. Признаки легкой формы теплового удара:
а) головная боль, тошнота, судороги
б) резкая адинамия, головная боль с тошнотой и рвотой, оглушенность.
в) адинамия, головная боль, тошнота
г) спутаность сознания, тошнота, судороги
д) головная боль, тошнота,тахикардия
11.Состояние организма, обусловленное общим перегреванием организма и возникшее под действием внешних тепловых факторов – это:
а) тепловой удар
б) солнечное перегревание
в) асфиксия
г) переохлаждение
д) тепловой дискомфорт
12.Отечность, цианоз, наличие пузырей со светлой жидкостью характерно для отморожения:
а) первой степени
б) второй степени

в) третей степени
г) четвертой степени
д) первой и четвертой степени
13.Укажите признаки, способствующие переохлаждению организма:
а) плохое настроение
б) низкая влажность воздуха
в) мокрая одежда и обувь
г) высокая температура воздуха и сильный ветер
д) солнечный удар
14.Появление пузырей, наполненных темной жидкостью, вокруг которых наблюдается воспаление, происходит при отморожении:
а) четвертой степени
б) первой степени
в) второй степени
г) третей степени
д) всех степеней
15.Наиболее часто холодом бывают поражены:
а) грудная клетка
б) лицо
в) живот
г) конечности
д) ягодицы
16.Тактика неотложной помощи при утоплении:
а) удаление воды из желудка, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца
б) дыхательные аналептики, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца
в) дыхательные аналептики, удаление воды из желудка, искусственная вентиляция легких
г) дыхательные аналептики, наркотические анальгетики, непрямой массаж сердца
д) удаление воды из желудка, наркотические анальгетики, искусственная вентиляция легких
17. У пожилых больных нецелесообразно быстрое снижение артериального давления из-за возможности:
а) развития инфаркта миокарда
б) развития острой сердечно-сосудистой недостаточности
в) задержки жидкости
г) ухудшения кровоснабжения жизненно-важных органов
д) развития инсульта
18. При оказании первойдоврачебной медицинской помощи при отморожениях запрещается...
а) проводить активное согревание конечности
б) использовать источники тепла постепенно превышая температуру до 40°С
в) заменить мокрую одежду сухими
г) растирать отмороженные участки снегом
д) напоить горячим чаем
19. Для электротравмы II степени тяжести характерно... .
а) судорожное сокращение мышц без потери сознания
б) судорожное сокращение мышц с потерей сознания
в) расстройства дыхания и кровообращения
г) потеря сознания

д) остановка сердца
20.Основным элементом первой доврачебной медицинской помощи при тепловом или солнечном ударе является:
а) назначение алкогольных напитков
б) назначение жаропонижающих средств
в) охлаждение пострадавшего
г) согревание пострадавшего
д) промывание желудка
21.Остановка дыхания и остановка сердечной деятельности происходят одновременно при ... утоплении.
а) синкопальном
б) асфиксическом
в) истинном
г) любом
д) влажном
22.Уничтожение в окружающей среде патогенных и условно-патогенных микроорганизмов называется:
а) дегеретизация
б) дератизацией
в) стерилизацией
г) дезинсекцией
д) дезинфекцией
23.Глубина введения иглы при проведении внутрикожной инъекции:
а) вся длина иглы
б) две трети иглы
в) в зависимости от расположения сосуда
г) только срез иглы
д) в зависимости от возраста больного
24.Срок использования маски процедурной медсестрой (в часах):
а) 4
б) 1
в) 3
г) 6
д) 5
25.При возникновении инфильтрата на месте подкожной инъекции необходимо:
а) сделать местный согревающий компресс или положить грелку
б) приложить пузырь со льдом
в) обколоть место инъекции 0,5% раствором новокаина
г) выше места инъекции наложить венозный жгут на конечность
д) кварцевать

2- вариант

1.Прикосновение к проводам, находящимся под напряжением, в большинстве случаев вызывает:
а) непроизвольное судорожное сокращение мыщц
б) полное расслабление мускулатуры
в) горизонтальное подергивание глаз
г) тошноту и рвоту
д) биологическую смерть
2.Первая помощь при электротравме, кроме:
а) охлождение водой
б) искусственное дыхание
в) непрямой массаж сердца
г) срочная госпитализация
д) освободить пострадавшего от действия электрического тока
3.Основная причина смерти при электротравме это:
а) угнетение дыхания
б) фибрилляция желудочков сердца
в) кровотечение и переломы
г) отрыв конечностей
д) ожог 1 степени
4. … цвета кожа у пострадавшего при синкопальном утоплении.
а) Розового
б) Фиолетово-синего
в) Бледного
г) Синеватого
д) Красного
5.Основные задачи первой помощи при утоплении:

а) постучать по спине
б) вытащить пострадавшего на берег и вызвать бригаду скорой помощи
в) вытащить пострадавшего и повернуть набок
г) вытащить пострадавшего на берег и привести в чувства
д) нажимать руками на грудь

6.У тонущего человека развивается острое кислородное голодание вследствие:
а) поступления воды в легкие
б) заполнения водой желудка
в) заполнения водой печени
г) отека легких
д) нарушения прохождения дыхательных путей

7.Классификация механической странгуляционной асфиксии включает повешение, … .
а) удавление петлей, сдавливание груди и живота
б) удавление петлей, удавление руками и иными предметами
в) закрытие дыхательных путей инородными предметами
г) утопление, удавление руками
д) удавление петлей, дыхательная недостаточность

8.Наиболее опасная ситуация при странгуляционной асфиксии создается, если:
а) петля наложена ниже гортани
б) узел расположен спереди
в) тело и ноги пострадавшего не имеют опоры
г) отсутствует самозатягивание петли
д) до повешения пострадавший принял наркотик

9.При оказании неотложной помощи при перегревании не следует допускать…
а) повышения артериального давления
б) резких движений
в) потери сознания
г) резкого переохлождения
д) коллапс

10.При тепловом ударе прохладные примочки кладут:
а) подключичные области
б) живот
в) поясницу
г) ладони и подошву
д) на подмышечные области

11.Для спасения человека при тепловом ударе необходимо:
а) переместить в прохладное место или тень
б) сделать теплые ножные ванны
в) положить холод на живот
г) дать принять мочегонное средство
д) напоить горячей жидкостью

12.Не больше … градусов температуры должна быть вода в ванне для согревания пострадавшего при переохлаждении.
а) 10
б) 30
в) 60
г) 20
д) 40

13.Переохлаждению подвержжены:
а) больные диабетом
б) подростки
в) люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
г) люди в состоянии алкогольного опьянения
д) больные туберкулезом
14.Из перечисленных поздних осложнений отморожений наиболее часто встречаются:
а) остеомиелит
б) сепсис
в) артрит
г) лимфаденит
д) флегмона
15.Острые поражения холодом – это:
а) полная гибель конечности в результате травмы
б) отморожения при температуре ниже 30°
в) синусовая тахикардия
г) поражение органа зрения
д) повышение температуры
16. Ларингоспазм возникает при ... виде утопления.
а) асфиксическом
б) истинном
в) синкопальном
г) любом
д) влажном
17. Утонувшего, находящегося без сознания следует транспортировать в положении лежа ... .
а) на животе при горизонтальном положении носилок
б) на спине с возвышенным положением головы
в) на спине с опущенным головным концом носилок
г) на животе с приподнятым ножным концом носилок
д) на спине с приподнятым ножным концом носилок
18.На догоспитальномэтапе оказания первой медицинской помощи из глаза могут быть удалены инородные тела ... .
а) внедрившееся в глазное яблоко
б) из-под нижнего и верхнего века
в) внедрившееся в роговицу
г) передней камеры глаза
д) внедрившееся в конъюктивальное пространство
19.При попадании ядовитых веществ на кожу необходимо...
а) обмыть пораженный участок асептическими растворами
б) наложить асептическую повязку
в) обтереть кожу влажной салфеткой
г) обтереть кожу тампоном со спиртом
д) обмыть пораженный участок проточной водой
20.При оказании первой доврачебной медицинской помощи при пищевых отравлениях в первую очередь применяют:
а) транспортировка в лечебное учреждение
б) парентеральную дегидратацию

в) промывание желудка
г) назначение внутрь солевых слабительных средств
д) назначение внутрь жаропонижающих средств
21.Основными признаками отравления ядохимикатами являются:
а) гиперемия кожных покровов
б) потливость, мышечная слабость
в) дыхание редкое, без хрипов
г) заторможенное состояние, снижение артериального давления
д) повышенное слюноотделение, потливость, отделение мокроты
22.Во время очередной инъекции медсестра обратила внимание на резко выраженную гиперемию кожи в месте инъекции: кожа как бы «натянута», блестит. Со слов больного с вечера беспокоит «пульсирующая» боль. Это осложнения называется:
а) повреждение седалищного нерва
б) медикаментозная эмболияей
в) инфильтратом
г) абсцессом
д) флегмоной
23.Подкожно можно вводить лекарственного препарата не более (в мл):
а) 2
б) 4
в) 3
г) 5
д) 10
24.Через несколько минут после введения лекарственного препарата, пациент пожаловался на зуд кожи и чувство жара. При осмотре: кожа покрыта мелкой розовой сыпью, горячая на ощупь. Это осложнения:
а) повреждение надкостницы
б) аллергическая реакция
в) сепсис
г) медикаментозная эмболия
д) воздушная эмболия
25.Перед введением стерильный масляный раствор необходимо подогреть до температуры (в градусах С):
а) 34
б) 40
в) 38
г) 8
д) 50

3-вариант

1.Средства защиты от поражения электрическим током?
а) хлопковая одежда
б) резиновые галоши
в) перчатки и коврики диэлектрические
г) предупреждающие знаки и плакаты
д) кепка или каска
2.Основные причины смерти при ударе током:

а) остановка дыхания и остановка сердца
б) потеря сознания
в) поражение внутренних органов
г) ожоги на поверхности кожи
д) повышение температуры тела
3.Клиника ожоговой болезни не включает:
а) периода реконвалесценции
б) периода ожогового шока
в) периода ожоговой интоксикации
г) периода ожогового истощения
д) скрытого (инкубационного) периода
4.Признаки утопления:
а) отсутствие пульса на сонной артерии
б) бледно серый цвет кожи
в) широкий нереагирующий на свет зрачок
г) набухание сосудов шеи
д) часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта
5.Синкопальное утопление наступает в результате:
а) спазма голосовой щели
б) эмоционального стресса
в) попадания массивного количества воды в легкие
г) травмы несовместимой с жизнью
д) остановка сердца
6.При утоплении в морской воде быстрее всего развивается:
а) отек легких
б) сердечная недостаточность
в) коллапс
г) одышка
д) шок
7.Истинное утопление характеризуется:
а) легкое расстройство сознания, рвота, набухание шейных вен.
б) отсутствием всех жизненных функций.
в) бледность кожных покровов, сухая пенная из ВДП
г) посинение лица и шеи, набухание шейных вен, обильные розовые выделения из ВДП
д) набухание шейных вен, сухая пена из ВДП
8. К странгуляционной относят асфиксию:
а) в замкнутом пространстве
б) от сдавливания груди и живота
в) от удавления петлей
г) от попадания инородных тел в дыхательные пути
д) от западания языка
9.Вторая (II) стадия асфиксического процесса характеризуется:
а) экспираторной одышкой
б) редкими глубокими вздохами
в) отсутствием дыхания
г) инспираторной одышкой
д) нормального дыхания
10. … не является признаками солнечного удара.

а) рвота, тошнота
б) покраснение лица
в) сильные головные боли
г) острая сердечная боль
д) судороги
11.При … возникает тепловой удар.
а) укусе ядовитых насекомых
б) ударе о горячий предмет
в) отравлении химическим веществом
г) воздействие на человека открытого огня
д) нарушении теплообмена в организме
12.Если пострадавший от теплового удара потерял сознание, необходимо предпринять действия:
а) сделать массаж сердца
б) хлопать по лицу
в) дать понюхать нашатырный спирт
г) приложить к голове мокрое полотенце
д) поднять в вертикальное положение
13.Озноблению при температуре, близкой к нулю, будет способствовать все перечисленное, кроме:
а) снижения общей и местной сопротивляемости
б) возраста пострадавшего
в) алкогольного опьянения
г) плохой одежды (легкая, не защищающая)
д) влажности окружающей среды
14.Консервативное лечение при отморожении имеет задачи, кроме одного:
а) восстановление шрамы кожи
б) восстановления кровообращения
в) борьбы с шоком и интоксикацией
г) профилактики инфекции
д) восстановления температуры тканей
15.Установив диагноз флегмоны при отморожении, следует:
а) ограничиться иммобилизацией
б) провести операцию вскрытия
в) пунктировать ее
г) проводить консервативную антибактериальную терапию
д) сделать новокаиновую блокаду
16.Проявление анафилактического шока:
а) резкая слабость, головокружение, снижение АД, мелкоточечная геморрагическая сыпь
б) резкая слабость, головокружение, брадикардия, мелкоточечная геморрагическая сыпь
в) бледность кожных покровов, снижение АД, мелкоточечная геморрагическая сыпь
г) резкая слабость, головокружение, бледность кожных покровов, снижение АД
д) резкая слабость головокружение, брадикардия, снижение АД
17.Общими принципами оказания первой доврачебной медицинской помощи при острых отравлениях являются:
а) применение парэнтеральной дегидротации
б) применение очистительной клизмы
в) удаление остатков яда из организма

г) применение болеутоляющих препаратов
д) применение активированного угля
18.Больной А., 28 лет,обнаружен в тяжелом коматозном состоянии. Жалобы: на сильные головные боли в височной области, головокружение, тошноту, рвоту, одышку, чувство нехватки воздуха. Со слов больного, свое состояние связывает с неисправностью отопительной системы в котельной, где он работает. Неотложное состояние, развившееся у пациента:
а) пищевое отравление
б) отравление суррагатами алкоголя
в) повышение артериального давления
г) понижение артериального давления
д) отравление угарным газом
19.При падении линии электропередачи был поражен электрическим током. Сознание отсутствует. Грудная клетка неподвижна. Пульс на сонной артерии частый, слабый. Пальцы правой кисти покрыты черным струпом.Пострадавшему в первую очередь проводится:
а) искусственная вентиляция легких
б) наружный массаж сердца
в) прекардиальный удар
г) прекращение воздействия электрического тока
д) обработка раневой поверхности
20.Угол наклона иглы при внутрикожной инъекции (в градусах):
а) 5
б) 45
в) 90
г) 60
д) не имеет значения
21.Место введения внутрикожной инъекции:
а) бедро
б) передняя брюшная стенка
в) средняя треть передней поверхности предплечья
г) голен
д) средняя треть наружной поверхности плеча
22.После использования резиновые перчатки подвергаются:
а) промыванию под проточной водой, стерилизации
б) дезинфекции
в) промыванию под проточной водой, дезинфекции
г) предстерилизационной очистке
д) промыванию под проточной водой, дезинфекции, дератизацией
23.Игла при подкожной инъекции вводится под углом (в градусах):
а) 45
б) 60
в) 90
г) 5
д) 120
24.Больной жалуется на боль в области инъекции, при пальпации болезненность, прощупывается уплотнение. Это осложнения:
а) липодистрофия

б) некроз
в) абсцесс
г) повреждение седалищного нерва
д) инфильтрат
25.При несоблюдении правил асептики может возникнуть осложнение:
а) флегмона
б) гематома
в) липодистрофия
г) абсцесс
д) анафилактический шок

Перечень практических навыков:

1. Техника проведения сердечно-легочной реанимации.
2. Тройной методика Сафара
3. Первый доврачебной помощь при ожогах
4. Правила наложения жгута при артериальном кровотечении
5. Десмургия
6. Техника проведение коникотомии
7. Первый доврачебный помощь при гипертоническом кризе
8. Первая доврачебная помощь при анафилактическом шоке
9. Первая доврачебная помощь при обмороке
10. Техника проведение промывания желудка

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Вопросы программы для рубежного контроля 2

Дисциплины: «Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях»
Код дисциплины: PDPPNS 1301
Шифр и наименование ОП: 6В10106 «Фармация»
Объем учебных часов (кредитов): 90 часов (3 кредита)
Курс и семестр изучения: 1 курс, 2 семестр

Составитель: ассистент кафедры, Оразбаева Э.А.

Хаттама № «11» «26» 06 2025ж.

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент _____ Сейдахметова А.А

«Первая доврачебная помощь» РК – 1
1 - вариант

Вопросы программы для промежуточной аттестации
«Первая доврачебная помощь» 2024-25 учебный год

1 Определить последовательность первой помощи при травме, сопровождающейся открытым переломом плеча и внутренним кровотечением:
- A. остановка наружного и внутреннего кровотечения, восполнение ОЦК, обезболивание
- B. иммобилизации конечности, восполнение ОЦК, обезболивание закисью азота
- C. остановка наружного и внутреннего кровотечения, введение дыхательных аналептиков
- D. восполнение ОЦК
- E. введение дыхательных аналептиков, ОЦК, обезболивание закисью азота

2 Укажите последовательность первой помощи при ожоговом шоке:
- A. обезболивание, восполнение ОЦК, обработка ожоговой поверхности
- B. обезболивание, восполнение ОЦК, введение сердечных гликозидов
- C. восполнение ОЦК, введение сердечных гликозидов, борьба с ОДН
- D. восполнение ОЦК, обработка ожоговой поверхности, борьба с ОДН
- E. обезболивание, введение сердечных гликозидов, борьба с ОДН

3 Проявление анафилактического шока:
- A. резкая слабость, головокружение, бледность кожных покровов, снижение АД
- B. резкая слабость, головокружение, брадикардия, мелкоточечная геморрагическая сыпь
- C. бледность кожных покровов, снижение АД, мелкоточечная геморрагическая сыпь
- D. резкая слабость, головокружение, снижение АД, мелкоточечная геморрагическая сыпь
- E. резкая слабость головокружение, брадикардия, снижение АД

4 Тактика неотложной помощи при утоплении:
- A. удаление воды из желудка, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца
- B. дыхательные аналептики, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца
- C. дыхательные аналептики, удаление воды из желудка, искусственная вентиляция легких
- D. дыхательные аналептики, наркотические анальгетики, непрямой массаж сердца
- E. удаление воды из желудка, наркотические анальгетики, искусственная вентиляция легких

5 Больной 30 лет, плотник, в течение 5 лет страдает язвенной болезнью желудка, утром на работе появилась резкая боль в эпигастрии, головокружение, слабость, потемнение в глазах, тошнота. Кожные покровы резко побледнели, появился холодный липкий пот. ЧДД 26 в мин. Частота пульса 120 в мин, малого наполнения и напряжения. АД 90/50 мм рт.ст. Живот втянут, напряжен, резко безболезненный. Ваш диагноз:
- A. язвенная болезнь желудка, перфорация язвы
- B. острый инфаркт миокарда
- C. язвенная болезнь желудка, период обострения
- D. острый панкреатит

E. острый холецистит

6 У пожилых больных нецелесообразно быстрое снижение артериального давления из-за возможности:
A. развития инсульта
B. развития острой сердечно-сосудистой недостаточности
C. задержки жидкости
D. ухудшения кровоснабжения жизненно-важных органов
E. развития ИМ

7 У больного после физической нагрузки появился приступ одышки, сопровождаемый удушьем, кашлем с выделением пенистой розовой мокроты. При осмотре: в легких влажные разнокалиберные хрипы с обеих сторон, мерцательная аритмия, увеличение печени, отеки на нижних конечностях. Указанные симптомы характерны для:
A. острой левожелудочковой недостаточности
B. приступа бронхиальной астмы
C. тромбоэмболии легочной артерии
D. спонтанного пневмоторакса
E. инфарктной пневмонии.

8 Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа сердца
A. перелом ребер
B. перелом ключицы
C. повреждение трахеи
D. перелом позвоночника
E. повреждение таза

9 Показания к прекращению реанимации:
A. появление признаков биологической смерти
B. отсутствие признаков эффективного кровообращения
C. отсутствие самостоятельного дыхания
D. широкие зрачки
E. бледность кожных покровов

10 При неэффективности реанимационных мероприятий их прекращают через:
A. 30 мин
B. 3-6 мин
C. 2 часа
D. 20-60 мин
E. 15 минут

11 Достоверный признак биологической смерти:
A. симптом «кошачьего глаза»
B. прекращение сердечной деятельности
C. прекращение дыхания расширение зрачка
D. расширение зрачка
E. бледность кожных покровов

12 Типичная форма инфаркта миокарда:
A. болевая
B. абдоминальная
C. асматическая
D. безволевая
E. аритмичная

13 Наиболее частым осложнением артериальной гипертензии является:

A. гипертензивный криз
B. миокардит
C. острая сердечная недостаточность
D. перикардит
E. хроническая почечная недостаточность

14 Критериями гипертензивного криза являются:
A. внезапный подъем АД
B. понижение АД
C. повышение АД до 159/90 мм. рт. ст.
D. появление головных болей в сочетании с повышением АД
E. признаки энцефалопатии

15 Основной жалобой пациента при бронхиальной астме является … .
A. приступ удушья
B. боль в грудной клетке
C. кашель с гнойной мокротой
D. кровохарканье
E. пенистая мокрота

16 Ведущий признак отека легких:
A. чувство нехватки воздуха, выделение розовой пенистой мокроты
B. повышение артериального давления
C. кашель с выделением стекловидной мокроты
D. боль в грудной клетке при вдыхании
E. резкое повышение АД, напряженный пульс

17 Развитие острого легочного сердца наиболее вероятно:
A. при массивной тромбоэмболии легочной артерии
B. при крупозной пневмонии
C. при инфаркте миокарда правого желудочка
D. при астматическом статусе 2й стадии
E. при респираторном дистресс синдроме взрослых

18 Для астматического статуса характерно:
A. нарастающее по интенсивности удушье
B. хороший эффект бета-2 адреностимуляторов
C. продуктивный кашель
D. полиурия
E. гипотензия

19 Одним из ведущих симптомов отравления угарным газом является:
A. стридорозное дыхание
B. экспираторная одышка
C. инспираторная одышка
D. дыхание Чейна- Стокса
E. одышка смешанного типа

20 Девушка 22 лет после ссоры приняла 10 таблеток капотена, после чего почувствовала резкое головокружение, слабость, потемнение в глазах. Испугавшись, вызвала бригаду «Скорой помощи».Оказание неотложной помощи целесообразно начинать с:
A. промывания желудка
B. искусственной вентиляции легких
C. введения гипертензивных средств
D. непрямого массажа сердца

E. прямого массажа сердца

21 У больного с тромбофлебитом глубоких вен нижних конечностей внезапно развилась одышка, появился кашель с прожилками крови, сердцебиение, выраженная слабость. Причиной развившегося состояния наиболее вероятно является:
A. тромбоэмболия ветвей легочной артерии
B. спонтанный пневмоторакс
C. приступ бронхиальной астмы
D. инородное тело в дыхательных путях
E. воздушная эмболия легочной артерии

22 В объем первой медицинской помощи входит:
A. временная остановка наружного кровотечения
B. переливание крови и кровезаменителей
C. первичная хирургическая обработка ран
D. ушивание сосуда на протяжении
E. наложение сосудистого шва

23 К мягким повязкам относятся:
A. бинтовые
B. пластмассовые
C. клеевые
D. крахмальные
E. гипсовые

24 К твердым повязкам относятся:
A. гипсовые
B. эластичные
C. бинтовые
D. контурные
E. сетчато-трубчатые

25 В зависимости от конструкции бинты подразделяются на ... .
A. ленточные, трубчатые, сетчато-трубчатые
B. эластические, марлевые, гипсовые
C. трубчатые, капроновые, эластомерные
D. сетчато-трубчатые, бумажные, крахмальные
E. сетчатые, трубчатые, резиновые

2 вариант

1 В зависимости от исходного материала бинты подразделяют на ... .
A. марлевые, трикотажные, эластические, резиновые
B. эластические, сетчатые, гемостатические, крахмальные
C. трикотажные, трубчатые, ленточные, резиновые
D. ленточные, трубчатые, бумажные, гипсовые
E. трубчатые, крахмальные, гипсовые, сетчатые

2 Ранним симптомом биологической смерти является:
A. появление симптома «кошачьего глаза»
B. трупное окоченение
C. положительная реакция на свет
D. сужение зрачков
E. положительный корнеальный рефлекс

3 Необходимым условием для проведения искусственной вентиляции легких являются:

A. очищение ротовой полости
B. применение воздуховодной трубки
C. наличие только специализированного врача
D. использование приспособления «рот - маска - рот»
E. наличие двух реаниматоров

4 К временной остановке кровотечения относятся:
A. наложение жгута выше раны
B. перевязка сосуда в ране
C. введение препаратов способствующих повышению свертывности крови
D. наложение сосудистого шва
E. диатермокоагуляция

5 Наложение жгута считается правильным при...
A. исчезновении пульса на артерии ниже уровня жгута
B. синюшности кожного покрова
C. отсутствии чувствительности кожи ниже уровня наложения жгута
D. повышении местной температуры кожи ниже жгута
E. гиперемии кожного покрова

6 При оказании помощи пострадавшему скровотечением из полости рта запрещается...
A. дать горячий чай или кофе
B. накладывать марлевую прокладку на место кровотечения
C. транспортировка в лечебное учреждение
D. усадить наклоном головы вперед
E. плотно тампонировать полость рта

7 Незначительно кровоточит раневая поверхность при ... кровотечении.
A. капиллярном
B. артериальном
C. паренхиматозном
D. венозном
E. абдоминальном

8 К характерным признакам венозного кровотечения относятся:
A. истечение крови постоянной струей темно-вишневого цвета
B. истечение крови пульсирующей струей алого цвета
C. медленное истечение крови (каплями)
D. кровоточивость всей раневой поверхности
E. истечение крови пульсирующей струей темно-вишневого цвета

9 К характерным признакам паренхиматозного кровотечения относится:
A. кровоточивость всей поверхности раны
B. истечение крови постоянной струей
C. истечение крови медленно каплями
D. истечение крови пульсирующей струей
E. кровоточивость только краев раны

10 Причинами ранних вторичных кровотечений могут быть:
A. отрыв тромба
B. ранение сосуда
C. снижение температуры тела
D. нагноение раны
E. повышение температуры тела

11 Жгут нужно наложить при...

A. кровотечениях из лучевой артерии
B. кровотечениях из вен предплечья
C. желудочных кровотеченях
D. кровотечениях из пищевода
E. носовых кровотечениях

12 Скопление крови в полости плевры называется:
A. гемоторакс
B. гемоперитонеум
C. гематома
D. гемартроз
E. гемоперикард

13 Признаком свидетельствующим о глубоких ожогах является:
A. наличие пузырей с темным геморрагическим содержимым
B. наличие пузырей с содержимым желтого цвета
C. наличие пузырей с прозрачной жидкостью
D. покраснение кожи в зоне поражения
E. отслойка эпидермиса с образаванием пузырей с прозрачной жидкостью

14 Недопустимым действием при оказании первой медицинской помощи пострадавшему с ожогом считается:

A. очистить обожженную поверхность от остатков обгоревшей одежды
B. обрезать одежду ножницами вокруг пораженного участка
C. дать пострадавшему соле-щелочное питье
D. наложение на поверхность ожоговой раны контурную повязку
E. транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение

15 При оказании первойдоврачебной медицинской помощи при отморожениях запрещается...
A. растирать отмороженные участки снегом
B. использовать источники тепла постепенно превышая температуру до 40°С
C. заменить мокрую одежду сухими
D. проводить активное согревание конечности
E. напоить горячим чаем

16 Правильным действием при оказании первой доврачебной медицинской помощи замерзшему считается:
A. согревание в ванной начиная с температуры воды20 С
B. обкладывание грелками с температурой воды выше40 С
C. растирание отмороженных участков тела пострадавшего снегом
D. предложить алкоголь с целью внутреннего согревания
E. растирание отмороженных участков тела пострадавшего спиртом

17 Критериями, по которым можно прогнозировать состояниепострадавшего при синдрома длительного сдавления являются:
A. длительность сдавления и масса сдавленных тканей
B. время, прошедшее с моментадекомпрессии и сила давления на ткани
C. степень ишемии и время сдавления
D. масса сдавленных тканей и вид катастрофы
E. сила давления на ткани и вид катастрофы

18 Степень тяжести синдрома длительного сдавления при компрессии обеих нижних конечностей в течение 8 часов и более составляет:

A. крайне тяжелая
B. средняя
C. тяжелая
D. легкая
E. средне-тяжелая

19 Достоверным признаком перелома является:
A. патологическая подвижность конечности и костная крепитация в зоне повреждения
B. абсолютное укорочение конечности и неестественное положение сустава
C. костная крепитация в зоне повреждения и удленения конечности
D. значительный отек в зоне повреждения и удленение конечности
E. изменение внешней формы и удленение конечности

20 При оказании первой доврачебной медицинской помощи при переломах запрещается:
A. удалять торчащие из раны костные отломки
B. провести комплекс противошоковых мероприятии
C. закрыть выступающие из раны костные отломки асептическойповязкой
D. провести транспортную иммобилизацию
E. при необходимости накладывать жгут

21 Утонувшего, находящегося без сознания следует транспортировать в положении лежа ... .
A. на животе с приподнятым ножным концом носилок
B. на спине с возвышенным положением головы
C. на спине с опущенным головным концом носилок
D. на животе при горизонтальном положении носилок
E. на спине с приподнятым ножным концом носилок

22 На догоспитальномэтапе оказания первой медицинской помощи из глаза могут быть удалены инородные тела ... .
A. из-под нижнего и верхнего века
B. внедрившееся в глазное яблоко
C. внедрившееся в роговицу
D. передней камеры глаза
E. внедрившееся в конъюктивальное пространство

23 При попадании ядовитых веществ на кожу необходимо...
A. обмыть пораженный участок проточной водой
B. наложить асептическую повязку
C. обтереть кожу влажной салфеткой
D. обтереть кожу тампоном со спиртом
E. обмыть пораженный участок асептическими растворами

24 При оказании первой доврачебной медицинской помощи при пищевых отравлениях в первую очередь применяют:
A. промывание желудка
B. парэнтеральную дегидратацию
C. транспортировка в лечебное учреждение
D. назначение внутрь солевых слабительных средств
E. назначение внутрь жаропонижающих средств

25 Основными признаками отравления ядохимикатами являются:
A. повышенное слюноотделение, потливость, отделение мокроты
B. потливость, мышечная слабость
C. дыхание редкое, без хрипов

D. заторможенное состояние, снижение артериального давления
E. гиперемия кожных покровов

3 вариант

1 Общими принципами оказания первой доврачебной медицинской помощи при острых отравлениях являются:
A. удаление остатков яда из организма
B. применение очистительной клизмы
C. применение парэнтеральной дегидротации
D. применение болеутоляющих препаратов
E. применение активированного угля

2 Проявлениями острой сердечной недостаточности по левожелудочковому типу являются:
A. одышка, цианоз, тахикардия
B. цианоз, брадикардия
C. тахикардия, повышение температуры тела
D. отеки на нижних конечностях
E. отеки на лице и на шее

3 Типичным признаком инфаркта миокарда является:
A. боль за грудиной продолжительностью более 20-30 минут
B. повышение артериального давления
C. понижение артериального давления
D. головная боль, тошнота, рвота
E. повторяющееся обморочное состояние

4 Больная 28 лет на даче у родственников ела землянику. Через два часа появились затруднение дыхания, ощущение сжимания в области шеи, неловкость при глотании. Ваш диагноз:
A. аллергический отек гортани
B. аллергический отек глотки
C. катаральная ангина
D. острый ларингит
E. заглоточный абсцесс

5 Больной А., 28 лет, обнаружен в тяжелом коматозном состоянии. Жалобы: на сильные головные боли в височной области, головокружение, тошноту, рвоту, одышку, чувство нехватки воздуха. Со слов больного, свое состояние связывает с неисправностью отопительной системы в котельной где он работает. Неотложное состояние, развившееся у пациента:
A. отравление угарным газом
B. отравление суррагатами алкоголя
C. повышение артериального давления
D. понижение артериального давления
E. пищевое отравление

6 На улице подобран мужчина в бессознательном состоянии. Изо рта выделяется сильный запах алкоголя, снижен мышечный тонус. Отсутствует словесный контакт. Первоочередное мероприятие:
A. промывание желудка
B. оксигенотерапия
C. введение антидота
D. дезинтоксикационная терапия

E. искусственная вентиляция легких

7 Дети использовали бензин при разжигании костра рядом с обочиной дороги. Произошло воспламенение одежды на одном из детей. На пораженной коже – покраснения, множественные пузыри с жидкостью темно-коричневого цвета. Допустимым действием при оказании первой доврачевной помощи обожженным считается:

A. обрезать одежду ножницами вокруг пораженного участка
B. снять с пострадавшего обгоревшую рубашку
C. смазать ожоговую поверхность спиртом
D. прокалоть и удалить пузыри с обоженной поверхности
E. смазать ожоговую поверхность вазелином или другой мазью

8 При падении линии электропередачи был поражен электрическим током. Сознание отсутствует. Грудная клетка неподвижна. Пульс на сонной артерии частый, слабый. Пальцы правой кисти покрыты черным струпом.Пострадавшему в первую очередь проводится:

A. прекращение воздействия электрического тока
B. наружный массаж сердца
C. прекардиальный удар
D. искусственная вентиляция легких
E. обработка раневой поверхности

9 Подросток 14 лет, в походных условиях, преодолевая овраг по бревну, упал на камень большого размера правым боком. Беспокоит боль в левой половине грудной клетки, усиливающиеся во время вдоха. При ощупывании определяется болезненность, ненормальная подвижность и признак «ступеньки» в области ребер. Вид транспортировки:

A. в положении полусидя
B. лежа на здоровом боку
C. лежа на спине
D. лежа на животе
E. лежа на спине с приподнятым головным концом носилок

10 У подростка 14 лет имеется проникающая рана грудной клетки,для закрытия раны применяются повязка:

A. окклюзионные
B. корригирующие
C. контурные
D. простые
E. давящие

11 В результате неисправности станка рабочий получил ранение грудной клетки металлическим предметом. На передней поверхности грудной клетки справа рана размером 8 х 3 см с неровным краями. В данном повреждении применяют повязку:

A. окклюзионную
B. колосовидную
C. циркулярную
D. крестообразную
E. «Дезо»

12 Наиболее эффективно яд из желудка удаляют путем...

A. промывания желудка
B. вызывания искусственной рвоты
C. приема внутрь активированного угля

D. очистительной клизмы
E. инфузионной терапии

13 При отравлении уксусной кислотой (эссенцией) при оказании первой доврачебной помощи применяют:
A. промывание чистой водой комнатной температуры
B. промывание желудка слабым раствором лимонной кислоты
C. промывание желудка раствором пищевой соды
D. обильное питье молока
E. промывание желудка со слабым раствором калия перманганата

14 Отек легких развивается при...
A. острой левожелудочковой сердечной недостаточности
B. коллапсе
C. острой сосудистой недостаточности
D. острой правожелудочковой сердечной недостаточности
E. острой дыхательной недостаточности

15 При эпилептическом припадке в первую очередь необходимо:
A. предупредить асфиксию
B. провести объективный осмотр
C. предупредить прикусывание языка
D. предупредить судороги
E. ввести успокоительные препараты

16 Причиной эндогенных отравлений может быть:
A. синдром длительного сдавления
B. применение химических веществ
C. употребление ядовитых грибов
D. вдыхание раздражающих газов
E. пищевая токсиконфекция

17 Пострадавший находится под легковым автомобилем, сознание ясное. Имеется открытый перелом предплечья, из раны пульсирующей струей вытекает алая кровь. Ваше первоочередное действие:
A. остановить кровотечение
B. извлечь пострадавшего с помощью присутствующих из-под машины
C. наблюдать за пострадавшим, ожидая машину скорой помощи
D. собрать анамнез у пострадавшего, пока не прибудет скорая помощь
E. дать понюхать нашатырный спирт.

18 При поступлении у больного с черепно-мозговой травмой имело место полное отсутствие реакций на обращенную речь, открывание глаз на болевые раздражения, сохранение координированных защитных движений, непроизвольное мочеиспускание. Состояние сознания:
A. сопор
B. умеренное оглушение
C. глубокое оглушение
D. поверхностная кома
E. глубокая кома

19 Для алкогольной комы характерны следующие признаки:
A. нарушение сознания, мидриаз, снижение температуры тела, снижение артериального давления, гиперсаливация

B. нарушение сознания, наличие на коже пострадавшего сине-багровых пятен, повышение артериального давления
C. нарушение сознания, выраженный миоз, на локтевых сгибах множественные следы от инъекций, патологическое дыхание по типу апноэ
D. сознание спутанное, выраженное чувство голода, анизокория
E. сознание спутанное, липкий пот, снижение артериального давления

20 Основное осложнение, возникающее при проведении непрямого массажа сердца:
A. перелом ребер
B. перелом ключицы
C. повреждение трахе;
D. перелом позвоночника
E. перелом грудины

21 Основным признаком остановки сердца является
A. отсутствие пульса на сонной артерии
B. отсутствие самостоятельного дыхания
C. широкие зрачки
D. отсутствие сознания
E. отсутствие пульса на лучевой артерии

22 Важнейшим отличительным признаком астматического статуса от тяжелого приступа бронхиальной астмы является:
A. отсутствие дыхательных шумов при аускультации
B. тахипноэ
C. тахикардия
D. цианоз
E. ортопноэ

23 Симптомы прохождения тока через мозг и сердце:
A. потеря сознания, остановка дыхания, фибрилляция желудочков сердца
B. повышение артериального давления, тахикардия
C. длительный спазм гладкой мускулатуры бронхов, гиперсекреция бронхиальных желез
D. иррадиирующие боли в области сердца, головная боль
E. боли в животе, внутреннее кровотечение

24 Характерный признак перелома:
A. крепитация костных отломков
B. кровоподтек
C. припухлость
D. нарушение функции конечности
E. боль

25 Возможным осложнением укушенных ран является:
A. бешенство
B. сибирская язва
C. гепатит
D. чума
E. дизентерия