КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Предмет: Детская терапевтическая и хирургическая стоматология-1

Код дисциплины: DTHS 5302-1

ОП дисциплины:6B10103-"Стоматология"

Количество учебных часов/кредитов:150 часов (5 кредитов)

Курс обучения и семестр: 5/9

Составитель: **ассистент**,Исмаилова Н.П.

Протокол № 11 «26» 06 2025

Зав. кафедрой м.м.н., и.о. доцент _____ Л.О. Конбаева

Шымкент-2025

Вопросы программы для рубежного контроля №1

1.Сравните анатомические, морфологические, гистологические и рентгенологические особенности временных и постоянных зубов с несформированными корнями. Приведите примеры.

2. Укажите сроки формирования, минерализации, прорезывания и формирования корней временных и постоянных зубов и охарактеризуйте их различия.

3. Назовите основные виды некариозных поражений твердых тканей зуба. Объясните их этиологию и патогенез в сравнительном аспекте.

4. Опишите клинические признаки, диагностические методы и лечение некариозных поражений зубов, приведите примеры наиболее распространённых форм у детей.

5. Укажите основные ошибки при лечении постоянных зубов с несформированными корнями, объясните возможные осложнения и предложите меры профилактики.

6. Приведите классификацию кариеса временных и постоянных зубов у детей, сравните их этиологию и патогенез.

7. Назовите меры профилактики некариозных поражений твердых тканей зубов и объясните их эффективность.

8. Опишите классификацию пульпитов временных зубов и постоянных зубов с несформированными корнями, сравните особенности клинического течения и диагностики.

9. Назовите методы лечения пульпитов у детей (витальная, девитальная, биологическая, ампутационная терапия), объясните их показания и противопоказания.

10. Охарактеризуйте основные виды периодонтитов временных зубов и постоянных зубов с несформированными корнями, сравните их клинические проявления и рентгенологические признаки.

11. Объясните диагностику и лечение острого периодонтита у детей. Приведите примеры возможных осложнений.

12. Охарактеризуйте этиологию, клинику, диагностику и лечение гингивита у детей. Сравните особенности гингивита, возникающего при прорезывании зубов.

13. Объясните особенности проведения местной анестезии в области верхней и нижней челюсти у детей при стоматологических вмешательствах. Приведите примеры применяемых анестетиков.

14. Сравните современные методы обезболивания в детской стоматологии (включая севоран), укажите их показания и противопоказания.

15. Назовите возможные местные и общие осложнения при проведении стоматологических вмешательств у детей, объясните принципы их профилактики и лечения.

Программа тестовых вопросов для рубежного контроля №1

1. Применяется при глубоком кариесе 1-го уровня активности:

Пломбирование с использованием

A. медицинского давления
B. ремтерапия 3 раза в год
C. ремтерапия один раз в год
D. допечатная пломбировка огнезащитной пломбой
E. последующая герметизация с использованием обезбаливающих слоев

2.Ремтерапию применяют при кариесе в стадии окрашивания:

A. электрофорез с препаратами кальция, фосфора
B. электрофорез с препаратами цинка, фтора
C. электрофорез с препаратами висмута, фтора
D. олово, электрофорез с препаратами фтора
E. электрофорез с препаратами меди, фтора

3.При лечении 3-х уровней активности среднего кариеса на зубах, корни которых еще не сформировались:

A. последующее пломбирование с местным применением препаратов кальция
B. Пломбирование в 1 прием с местным применением препаратов кальция
C. Ремтерапия 1 раз в год с местным применением препаратов Са
D. Ремтерапия два раза в год с местным применением препаратов кальция
E. Разглаживание с местным применением препаратов кальция

4.Назовите положительные свойства стеклоиономерных цементов.

A. отсутствие раздражения тканей и выделения фторидов
B. разделение органических кислот
C. оказывающий раздражающее действие на ткани
D. вторичное свойство, вызывающее кариес
E. для обеспечения образования одонтобластов

5.Требования к материалам, применяемым для лечебных прокладок при лечении глубокого кариеса:

A. оказывает противовоспалительное и одонтотропное действие
B. хорошая пластичность, быстрое затвердевание
C. механически прочный, высокая адгезия к тканям зуба
D. рыхлый, хорошая пластичность
E. по цвету зубов технология жесткая

6.Виды пульпита, встречающиеся только во временных зубах:

A. с поражением острого пульпита тканей пародонта и лимфатических узлов
B. острый секреторный частичный пульпит с поражением лимфатических узлов
C. хронический гипертрофический пульпит
D. острый гнойный частичный пульпит
E. хронический гангренозный пульпит

7.Электроодонтодиагностика проводится на следующих зубах:

Корни

A. образуются регулярно
B. является временным с несформированными корнями

C. временный с накачанными корнями
D. — несформированная константа
E. — константа, корневой конец которой не закрыт.

8.Считается решающим в сравнительной диагностике хронического фиброзного пульпита и глубокого кариеса.
A. — длительность болевых ощущений при нырянии
B. глубина кариозной полости
C. наличие открытого мягкого дентина в полости
D. наличие в полости густопигментированного дентина
E. ударные и ныряющие

9.Препарат, используемый для мумификации тканей.
A. смеси, содержащие формальдегид
B. цинк-эвгенольная смесь
C. не выдавливать параформальдегидную композицию
D. компресс на основе антисептиков
E. припарки, содержащие йодоформ

10.При лечении хронического фиброзного пульпита постоянных зубов без корней применяют метод:
A. с последующей глубокой ампутацией с пломбированием корневых каналов
B. витальная ампутация
C. девитальная экстирпация
D. биологический метод
E. жизненно важное искоренение

11.Девитальная экстирпация тканей, которая представляет собой:
A. полное удаление тканей после смерти
B. частичное удаление жизнеспособной ткани
C. полное удаление жизнеспособных тканей
D. частичное удаление ткани после мортификации
E. применение лекарственных средств

12.Используется для расширения корневых каналов:
A. Раствор ЭДТА
B. раствор параформальдегида
C. раствор хлоргексидина
D. раствор йодоната
E. 10% раствор йода

13.Мумификация тканей – это:
A. перенос ткани в асептическую ткань
B. После девитализации удаление тканей
C. удаление тканей после анестезии
D. получить воспаление в ткани
E. спасти жизнь и удалить ткани

14.На рентгенограмме: присасывание корней, корни временных зубов и фолликулы постоянных зубов соединены друг с другом, это характерно:
A. для физиологического отсасывания
B. патологического присасывания
C. быстро отсосать
D. сосать медленно
E. отсосать раньше времени

15.На рентгенограмме: полость пародонта равномерно расширена, в области корня очаг остеопороза с нечеткими краями:
A. хронический фиброзный пародонтит
B. хронический зернистый периодонтит
C. хронический гранулематозный периодонтит
D. хронический фиброзный пульпит
E. хронический гипертрофический пульпит

16.Когда болит вертикальная перкуссия:
A. при остром периодонтите
B. при остром серозном пульпите
C. при хроническом фиброзном пульпите
D. при хроническом гипертрофическом пульпите
E. при хроническом гангренозном пульпите

17.Хронический гранулированный периодонтит диагностируют на основании рентгенологических изменений костной ткани вокруг корня.
A. распад костной ткани без четких границ
B. отсутствие изменений в тканях пародонта
C. разложение костной ткани с четкими границами
D. расширение пародонтальной полости на конце корня
E. очаги распада костных тканей меньше зоны роста

18.Разрушение зародыша постоянного зуба, что является осложнением:
A. хронического зернистого периодонтита
B. декомпенсированная форма кариеса
C. хронический гангренозный пульпит
D. хронического гипертрофированного пульпита
E. хронического фиброзного периодонтита

19.Тяжесть флюороза в эндемических очагах зависит от следующей причины:
A. к количеству фтора в воде
B. к общему состоянию организма
C. к местному состоянию организма
D. к количеству кальция
E. на количество фосфора

20.Приобретенные дефекты постоянных зубов, обусловленные стадией формирования, чаще всего:
A. является систематическим
B. является локальным
C. фокус
D. не является обязательным
E. не является обязательным

21.Чрезмерное увеличение гликогена наблюдается в деснах детей следующего возраста:
A. до 3 лет
B. от 3 до 5 лет
C. 5-10 лет
D. от 3 до 7 лет
E. от 1 до 6 лет

22.Проявления, характерные для фиброзного типа гипертрофированного гингивита

A. десны повреждены, увеличены
B. зачатки десен рыхлые, увеличенные, отслаиваются
C. десны красные и опухшие
D. резинка серо-розового цвета, втягивание
E. десны воспалены, альвеолярная кость рассасывается

23.Хронический катар у детей вызывает гингивит
A. плохая гигиена полости рта
B. вредные привычки
C. респираторные заболевания
D. желудочно-кишечные заболевания
E. острые инфекционные заболевания

24.Состояние десен при остром катаральном гингивите:
A. завышен
B. исчез
C. в синяках
D. выбран
E. недоступен

25.По словам Кулаженко, сокращение времени образования гематомы при вакуумной пробе показывает:
A. повышение проницаемости и снижение эластичности стенок сосудов пародонта
B. наличие гликогена в деснах
C. отсутствие воспаления при роже
D. нарушение целостности прикрепления зубной челюсти
E. кислородный дисбаланс в деснах

26.При количестве фтора в воде 2,5 мг/л на зубах появляется следующий вид эрозий с обнажением дентина:
A. язвенная форма флюороза
B. полосчатый тип флюороза
C. пятнистая форма флюороза
D. деструктивная форма флюороза
E. системная гипоплазия

27.Проявления, характерные для отечной формы гипертрофированного гингивита
A. зачатки десен рыхлые, увеличенные, отслаиваются
B. зачатки десен плотные, поврежденные, увеличенные
C. десны красные и опухшие
D. десны серо-розовые, втяжение
E. десны воспалены, альвеолярная кость рассасывается

28.Назначают самое основное лечение острого герпесного стоматита:
A. антивирус
B. уменьшает тепло тела
C. анестетик
D. антисептик
E. укрепляет иммунитет

29.Первые симптомы, характерные для тяжелой формы острого герпесного стоматита
A. повышение температуры тела до 39-40 градусов
B. лимфаденит подчелюстных лимфатических узлов
C. сыпь во рту
D. гингивит
E. отсутствие аппетита

30.Способ лечебной физкультуры в период обострения острого герпесного стоматита у детей.
A. НЛО - терапия, кислородный коктейль
B. электрофорез, УФО-терапия
C. УВК - терапия, кислородный коктейль
D. парафинотерапия УФО - терапия
E. дарсонвализация, массаж

31.При каком из перечисленных заболеваний помимо костей челюсти наблюдаются рентгенологические нарушения черепа, таза, ключиц, плоских костей:
A. Х - гистиоцитоз
B. доброкачественная наследственная нейтропения
C. диабет
D. гипоиммуноглобулинемия
E. Синдром папийона-Лефевра

32.В полости рта нет подъязычного основания.
A. на деснах, спинке языка и твердом небе
B. на нижней части языка
C. в слизистой оболочке губ
D. в костре
E. на мягком нёбе

33.Назовите возбудителя дифтерии.
A. стержень Леффлера
B. вирус простого герпеса
C. фильтрующий вирус
D. гемолитический стрептококк
E. вирус Коксаки

34.Заживление афт в виде стоматита у детей заканчивается рубцеванием
A. Афты Сеттона
B. Поспишил афтоидный
C. синдром Бехчета
D. синдром Стивенса-Джонсона
E. Беднарские афты

35.Причины развития афты Беднара у детей
A. хроническая механическая травма
B. стержень Леффлера
C. вирус простого герпеса
D. Дрожжеподобный гриб Candida
E. сенсибилизация организма к аутоинфекции

36.Молочницу полости рта можно сравнить со следующими заболеваниями:
A. скарлатина, корь, дифтерия
B. блистер,острый герпесный стоматит, лекарственный стоматит
C. стенокардия, заболевания крови, инфекционный мононуклеоз
D. острый герпесный стоматит, дифтерия, ангина
E. дифтерия, корь, дизентерия

37.Метод лабораторного определения сифилиса
A. Реакция Вассермана
B. реакция Манту
C. реакция прямой агглютинации
D. реакция непрямой агглютинации
E. иммуноблоттинг

38.На какой стадии заболевания при остром герпесном стоматите не назначают противовоспалительные препараты
A. период эпителизации
B. продромальный период
C. катаральный период
D. — стадия прогрессирования заболевания
E. инкубационный период

39.При остром герпесном стоматите необходимо назначать ребенку в период ремиссии заболевания.
A. лечение кератопластики, уход за полостью рта
B. противовоспалительные вещества
C. обезболивающие препараты для кератопластики
D. десенсибилизирующие, противовоспалительные вещества
E. противовоспалительные, антисептические вещества

40.Пути заражения СПИДом у детей:
A. внутриутробный
B. капля
C. воздушно-капельный
D. реляционный, по каплям
E. домашнее хозяйство

Вопросы программы для рубежного контроля №2

1. Сравните показания и противопоказания к удалению временных и постоянных зубов у детей. Приведите примеры.

2.Перечислите основные хирургические инструменты, используемые при удалении зубов, и опишите их назначение.

3.Назовите интраоперационные и послеоперационные осложнения, возникающие при удалении зубов у детей. Объясните принципы их профилактики и лечения.

4. Перечислите виды гигиенических средств полости рта. Объясните механизм образования зубной бляшки и её состав.

5. Охарактеризуйте классификацию, клинику и диагностику одонтогенного периостита челюстей у детей. Объясните тактику лечения.

6. Назовите возможные осложнения периостита у детей и объясните меры их профилактики.

7. Объясните роль анаэробной инфекции при гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. Особенности анамнеза, клиники и лабораторной диагностики.

8. Объясните классификацию, клиническое течение, диагностику и лечение лимфаденита челюстно-лицевой области у детей в сравнительном аспекте.

9. Перечислите возможные осложнения лимфаденита и объясните пути их профилактики.

10. Объясните принципы применения пробиотиков при местном лечении одонтогенной гнойной инфекции челюстно-лицевой области. Приведите клинический пример.

11. Охарактеризуйте классификацию, клинику, диагностику и лечение остеомиелита челюстно-лицевой области у детей (острого и хронического).

12. Объясните особенности острого гематогенного остеомиелита у детей: патогенез, клинические и диагностические признаки, принципы лечения.

13. Перечислите классификацию заболеваний слюнных желез у детей. Сравните клинику, диагностику и лечение основных заболеваний.

14. Опишите основные осложнения остеомиелита у детей, объясните тактику профилактики и лечения.

15. Сравните эпидемический и неэпидемический паротит. Объясните клинику, диагностику, методы лечения и возможные осложнения.

Программа тестовых вопросов для промежуточного контроля №2

1.Является показанием к хирургическому лечению перелома нижней челюсти у детей.
A. переломы, сопровождающиеся смещением трещин
B. субхондральные переломы
C. фрагменты типа "зеленая ветка"
D. перелом ветви нижней челюсти
E. перелом тела нижней челюсти без смещения

2. Полная расщелина верхней губы у ребенка, вызванная левосторонним рождением. Опишите Статуслокалис:
A. наличие дефекта, сопровождающегося нарушением целостности дна полости носа, укорочением верхней губы и утолщением кожно-хрящевой части носа
B. наличие дефекта, сопровождающегося нарушением целостности дна полости носа
C. наличие дефекта, сопровождающегося укорочением верхней губы и утолщением кожно-хрящевой части носа, не достигающим дна полости носа.
D. наличие дефекта, не доходящего до дна полости носа
E. наличие дефекта, сопровождающееся нарушением целостности дна полости носа, дефект распространяется на альвеолярный отросток и твердое и мягкое небо

3. Последствия повреждения зоны роста нижней челюсти:
A. задержка роста челюсти
B. гибель зубного зачатка
C. повреждение зубного фолликула
D. гипоплазия твердых тканей зуба
E. нарушение периода прорезывания зубов

4. Показания к прикладной анестезии тканей лица и челюстной области у детей:
A. анестезия и инъекции слизистой оболочки

B. открытые поднадкостничные абсцессы и абсцессы мягких тканей
C. удаление молочных зубов верхней и нижней челюсти
D. удаление временных и постоянных зубов верхней челюсти
E. удаление временных и постоянных зубов нижней челюсти

5. Причина образования гематомы при местной анестезии:
A. игольная травма кровеносного сосуда
B. несоблюдение правил асептики
C. быстрая доставка анестетика
D. аллергия на местные анестетики
E. травматическая хирургия

6. Осложнения при удалении зуба:
A. перелом корня и корня удаленного зуба
B. синусит
C. периостит
D. альвеолит
E. остеомиелит

7. Общая анестезия включает:
A. эндотрахеальная анестезия
B. атаралгезия
C. проводниковая анестезия
D. вагосимпатическая блокада
E. инфильтрационная анестезия

8. Используется для ингаляционной анестезии:
A. фторэтан
B. калипсо
C. дроперидол
D. оксибутират натрия
E. гексеналь

9. Используется для внутривенной анестезии:
A. калипсо
B. фторэтан
C. азотная кислота
D. циклопропан
E. трихлорэтилен

10. Пульс при коллапсе...
A. редкий, жилистый
B. частый, вязкий
C. часто бывает всесторонним
D. редкий, округлый
E. не определен

11. Анафилактический шок развивается вследствие...
A. аллергическая реакция
B. диатез
C. опьянение
D. хронический панкреатит
E. тяжелая работа

12. Основные последствия развода:
A. рефлекторное сужение сосудов головного мозга
B. аллергическая реакция

C. рефлекторное сужение сосудов сердца
D. острая сосудистая недостаточность
E. острая сердечная недостаточность

13. При наличии следующих сопутствующих заболеваний операцию по удалению зуба проводят в отделении стационара:
A. гемофилия, тромбопения
B. тиреотоксикоз
C. аллергическая реакция на сульфаниламиды
D. хронический гепатит
E. сахарный диабет в стадии компенсации

14. Причина шока при операции по удалению зуба:
A. аллергическая реакция
B. сужение сосудов головного мозга
C. удаление зуба на длительный срок
D. гипертоническая болезнь
E. сильный страх перед операцией

15. Расположение отверстия под глазом:
A. на 0,5 - 075 см ниже нижнего края глазницы, на уровне пересечения воображаемой горизонтальной линии и воображаемых вертикальных линий по второму малому моляру верхней челюсти и от подбородочного отверстия
B. от внутренней поверхности альвеолярного отростка, на уровне средней части третьего моляра верхней челюсти
C. над верхним краем глазного отверстия
D. между центральными лопаточными зубами верхней челюсти
E. крыло - в расщелине неба

16. Клинические признаки развившегося коллапса:
A. обморок больного
B. непроизвольное мочеиспускание
C. сердечная недостаточность
D. апноэ и остановка сердца
E. судороги

17. Назовите причину отмирания слизистой оболочки твердого неба, возникающую после анестезии:
A. отправить большое количество анестетика
B. введение 0,1-0,2 мл анестетика
C. травмирование большого небного нерва иглой
D. повреждение малого небного нерва иглой
E. заложенность носа – повреждение небного нерва

18. Какой из этих препаратов относится к группе эфиров местных анестетиков:
A. дикаин, хлорэтил, новокаин
B. тримекаин, лидокаин, бупивакаин
C. анальгин, аспирин, парацетамол
D. димедрол, супрастин, тавегил
E. реланиум, седуксен

19. Перечислите местноанестезирующие средства, относящиеся к группе амидов:
A. тримекаин, лидокаин, бупивакаин
B. дикаин, хлортил, новокаин
C. димедрол, супрастин, тавегил
D. анальгин, аспирин, парацетамол

E. реланиум, седуксен

20. Основная функция воротниковых лимфатических узлов:
A. обезвреживание микробов и токсинов
B. синтез тромбоцитов
C. сбор и замена лимфоцитов
D. скачать лимфоциты
E. производят лимфоциты

21. Укажите вид местного осложнения, возникающего при местной анестезии челюстно-лицевой области:
A. гематома
B. Получить
C. анафилактический шок
D. опьянение (отравление)
E. свернуть

22. Опухоль, образовавшаяся из жировой ткани, называется...
A. липома
B. атерома
C. папиллома
D. фиброма
E. гемангиома

23. Вследствие сдавления верхних дыхательных путей развивается тип асфиксии.
A. обтурация
B. вывих
C. стенотический
D. клапан
E. является желательным

24. Эта опухоль имеет четыре типа: плоскую, серозную, рацематную, смешанную.
A. гемангиома
B. лимфангиома
C. липома
D. атерома
E. невринома

25. Признак угрозы предраковых заболеваний:
A. усиление процессов ороговения
B. медленный рост
C. Ухудшение общего состояния
D. формирование мешка
E. экспансивный рост

26, Лечение серозного лимфаденита:
A. консервативное лечение
B. элемент управления
C. фрагмент
D. Получить узел
E. лечение обезвоживания

27. Данная опухоль рентгенологически имеет литический и клеточный типы.
A. остеобластокластома
B. амелобластома
C. адамантинома
D. остеома

E. остеоид - остеома

28. Передняя часть верхней губы и верхний альвеолярный отросток развиваются во внутриутробном периоде.
A. от первичного неба
B. от каждой основной губы
C. от альвеолярного роста
D. изо рта
E. от расщелины нёба

29. Вид анестезии верхней челюсти по проводимости:
A. клубневый
B. торусал
C. нижняя челюсть
D. менталитет
E. По Берше-Дубову

30. Для того чтобы обезболить одновременно нижнеклеточные и язычные нервы, применяется... тип наркоза.
A. нижняя челюсть
B. при мысленном открытии
C. возле большого неба
D. клубневый
E. возле ямы от лопаты

31. Для того чтобы одновременно обезболить нижнеклеточные, слуховой и язычный нервы... применяют наркоз.
A. торусал
B. возле большого неба
C. нижняя челюсть
D. клубневый
E. подглазничный

32. Вид проводниковой анестезии нижней челюсти:
A. торусал
B. подглазничный
C. клубневый
D. возле большого неба
E. нижняя челюсть

33. Во время мандибулярной анестезии... нервы немеют.
A. нижняя ячейка и язык
B. Мы нажимаем
C. верхняя и нижняя ячейка
D. язык и диалект
E. мы добавили язык и нижнюю ячейку

34. Во время торусальной анестезии... нервы немеют.
A. нижняя ячейка, язык и язык
B. лингвальный, верхнечелюстной, нижнечелюстной
C. язык, подбородок, язык
D. верхняя и нижняя ячейка
E. нижняя ячейка и язык

35. Назовите основной вид анестезии, применяемый при удалении временных зубов верхней челюсти:
A. проникновение

B. клубневый
C. подглазничный
D. внутрикостный
E. лопата возле лунки зуба

36. Не рекомендуется применять анестетики, содержащие адреналин, детям до этого возраста:
A. 5
B. 3
C. 6
D. 7
E. 10

37.Покажите механизм действия местных анестетиков.
A. уменьшение прохождения йодида натрия в клеточную мембрану, что сопровождается эффектом стабилизации мембраны
B. увеличение прохождения ионов кальция к клеточной мембране и потенциала действия
C. подавление боли на уровне задних рогов спинного мозга
D. подавление боли на уровне таламуса
E. снижение прохождения йодида калия в клеточную мембрану

38. Точка действия анестетиков:
A. чувствительные нервные окончания и проводники
B. кора головного мозга, чувствительные нервные окончания
C. таламус, окончания чувствительных нервов
D. лимбическая система и проводники
E. задние рога и проводники спинного мозга

39. Местный анестетик с сосудосуживающим действием:
A. мепивакаин
B. лидокаин
C. артикаин
D. анестетик (бензокаин)
E. Прокаин (Новокаин)

40. Препарат, применяемый при прикладной анестезии:
A. лидокаин
B. мепивакаин
C. артикаин
D. бупивакаин
E. Прокаин (Новокаин)

41. Эффективный препарат при воспалении полости рта:
A. артикаин
B. мепивакаин
C. лидокаин
D. бупивакаин
E. Прокаин (Новокаин)

42. Противопоказаниями к операции под наркозом в условиях стоматологической поликлиники являются:
A. декомпенсированная сердечная недостаточность
B. скрытый тип мешала
C. бронхиальная астма в стадии компенсации
D. хронический эрозивный гастрит
E. хронический тонзиллит

43. Метод изучения жевательной деятельности называется...

A. мастикоциография
B. рентген
C. электромиография
D. телерентгенография
E. томография

44. Зубы ретрузия означает:
A. расположение фронтальных зубов в оральном направлении
B. расположение фронтальных зубов в вестибулярном направлении
C. положение боковых зубов по направлению рта
D. расположение боковых зубов в дистальном направлении
E. положение боковых зубов в мезиальном направлении