БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ
Бағдарламаның 1 аралық бақылауға арналған сұрақтары
Пәні: Фармакотерапия
Пән коды: Fart 2219
ББ шифры мен атауы: 6В10106 «Фармация»
Оқу сағаты/кредит көлемі: 5/150
Оқу курсы мен семестрі: 2 курс, 4 семестр

Құрастырған: профессор м.а. Пернебекова Р.К.

Кафедра меңгерушісі: профессор м.а. Токсанбаева Ж.С.

Хаттама:

2025-2026 ж.

Бағдарламаның 1 аралық бақылауға арналған сұрақтары

1. Науқастың дәрілік заттарға жеке сезімталдығын қандай факторлар анықтайды?
2. Рационалды фармакотерапияның негізінде қандай қағидалар жатыр?
3. Комбинирленген терапия тағайындағанда клиникалық маңызы бар қандай дәрілік өзара әрекеттесулер кездеседі?
4. Дәрілердің қай енгізу жолдары емдік әсердің ең жылдам басталуын қамтамасыз етеді?
5. Дәрілік заттардың биожетімділігіне қандай факторлар әсер етеді?
6. Дәрілік препараттарды дұрыс қолданбаған жағдайда қандай асқынулар пайда болуы мүмкін?
7. Созылмалы ауруларды фармакотерапиялауда дозаны титрлеудің қандай принциптері қолданылады?
8. Симптоматикалық емдеуде қандай препарат топтары қолданылады?
9. Бета-лактамды антибиотиктерге қандай препараттар жатады?
10. Пневмонияны емдеуде таңдау препараттары қайсы?
11. Микроорганизмдердің антибиотиктерге төзімділігін қандай факторлар анықтайды?
12. Стафилококк инфекцияларын емдеуде қандай антибиотиктер қолданылады?
13. Туберкулезді терапиялауда қандай препараттар пайдаланылады?
14. Қандай дәрілік заттар макролидтер қатарына жатады?
15. Антибиотиктерді ұзақ қолданған кезде қандай асқынулар туындауы мүмкін?
16. Тұмауды емдеуде қандай вирусқа қарсы препараттар қолданылады?
17. Кандидоздық инфекцияларды емдеудің бірінші қатар препараттары қайсы?
18. Клиникалық практикада эмпирикалық антибактериалды терапияның қандай қағидалары қолданылады?
19. Антигистаминдік дәрілерге қандай препараттар жатады?
20. Анафилактикалық шокты емдеуде қандай дәрілік заттар қолданылады?
21. Аллергиялық ринитті емдеу үшін қандай препараттар тағайындалады?
22. Атопиялық бронх демікпесін емдеуде қандай препарат топтары пайдаланылады?
23. Жүйелі глюкокортикостероидтарды ұзақ қолданғанда қандай асқынулар туындауы мүмкін?
24. Мес жасушаларының мембрана стабилизаторлары болып табылатын қандай препараттар бар?
25. Тері аллергиялық реакцияларын басу үшін қандай дәрілік заттар қолданылады?
26. Қай препараттар есекжемді (крапивница) емдеуде қолданылады?
27. Стероидты емес қабынуға қарсы дәрілерге қандай препараттар жатады?
28. Ревматоидты артритті емдеуде қандай дәрілік заттар қолданылады?
29. Жедел қабынуды басу үшін қандай препарат топтары қолданылады?
30. СҚҚД (НПВС) ұзақ қолданғанда қандай асқынулар тән?
31. Жүйелі қабыну ауруларында қолданылатын глюкокортикостероидтарға қандай препараттар кіреді?
32. Дене қызуын төмендету үшін қандай дәрілер қолданылады?
33. Базистік (негіздік) антиревматизмдік препараттарға қандай дәрілер жатады?
34. Қандай препараттар антидепрессанттар қатарына кіреді?
35. Жалпы үрейлік бұзылысты емдеуде қандай дәрілік заттар қолданылады?
36. Эпилепсияны емдеуде қандай препараттар пайдаланылады?
37. Шизофренияны емдеуде қандай дәрілік заттар тағайындалады?
38. Нормотимиктерге қандай препараттар жатады?
39. Антипсихотиктерді қолданғанда қандай асқынулар болуы мүмкін?
40. Жедел психомоторлық қозуды басу үшін қандай препараттар қолданылады?
41. Дәрілік формулярдың мақсаты қандай?

Бағдарламаның 1 аралық бақылауға арналған тест сұрақтары

Құрастырушы: профессор м.а. Пернебекова Р.К.

Кафедра меңгерушісі: _____ _ профессор м.а. Токсанбаева Ж.С.

Хаттама

1. Мемлекеттік бюджет есебінен дәрілерді сатып алу осы тізімге сәйкес жүргізілетін, ең тиімді және сенімді дәрілік заттардың тізімі қалай аталады?
A. негізгі (өмірлік маңызды) дәрілік заттар тізімі
B. Дәрілік заттардың Мемлекеттік тізілімі
C. дәрілік заттардың номенклатурасы
D. дәріхана рецептурасы
E. фармакопея
2. Мемлекеттік бюджет есебінен дәрілерді сатып алу осы тізімге сәйкес жүргізілетін, ең тиімді және сенімді дәрілік заттардың тізімі қалай аталады?
A) негізгі (өмірлік маңызды) дәрілік заттар тізімі
B) Дәрілік заттардың Мемлекеттік тізілімі
C) дәрілік заттардың номенклатурасы
D) дәріхана рецептурасы
E) фармакопея
3. Фармакотерапия мақсаттарына жатады…
A) толық айығу
B) жартылай айығу
C) өмір сапасының төмендеуі
D) өмір деңгейінің жоғарылауы
E) аурушаңдық қаупін төмендету
4. Қанның дәріден тазару жылдамдығы және оның организмнен шығарылуы қалай аталады?
A) клиренс
B) жартылай шығарылу кезеңі
C) биожетімділік
D) элиминация
E) алғашқы өтудің әсері
5. Дәрілерді ұзақ қолданғанда ішектің қалыпты микрофлорасының бұзылуы қалай аталады?
A) дисбактериоз
B) аллергиялық реакция
C) абстиненттік синдром
D) идиосинкразия
E) дәрілік тәуелділік
6. Организмде белгілі өзгерістерден кейін ғана фармакологиялық белсенділікке ие болатын зат қалай аталады?
A) пролекарство
B) дәрілік зат
C) плацебо
D) прекурсор
E) депо-препарат
7. Терапиялық мониторингке не кіреді?
A) қандағы дәрі концентрациясын жүйелі анықтау
B) метаболизм жолдарын анықтау
C) әсер ету механизмін анықтау
D) әсердің селективтілігін анықтау
E) тағамның сіңірілуге әсерін анықтау
8. Материалдық кумуляция туғызатын препарат…

A) дигитоксин
B) строфантин
C) альбумин
D) этиленгликоль
E) налоксон
9. Изониазид қолданғанда пациенттің «баяу ацетилятор» екені анықталды. Бұл сезімталдықты зерттейтін ғылым?
A) фармакогенетика
B) фармакодинамика
C) фармакокинетика
D) фармакология
E) клиникалық фармакология
10. GCP — бұл халықаралық кодекс, ол неге арналған?
A) дұрыс клиникалық практика
B) дұрыс зертханалық практика
C) дұрыс өндірістік практика
D) дәрілерді дұрыс сату сапасы
E) дәрілерді дұрыс тағайындау
11. Зерттеу демеушісінің міндетіне не жатады?
A) клиникалық зерттеулерді қаржыландыру және басқару
B) клиникалық жұмысты орындау
C) ақпараттандырылған келісім алу
D) деректерді талдау
E) қорытынды ұйымдастыру
12. Өлімге әкелген немесе өмірге қауіп төндірген жағымсыз жағдайды демеуші неше күн ішінде хабарлауы тиіс?
) 7 күн
B) 5 күн
C) 15 күн
D) 24 күн
E) 30 күн
13. I фаза зерттеулеріне кімдер қатысады?
A) дені сау еріктілер
B) белгілі ауруы бар пациенттер
C) нақты диагноз қойылған пациенттер
D) тек әйелдер
E) тек балалар
14. I фаза клиникалық зерттеулерінің негізгі мақсаты:
A) қауіпсіздігін, тиімділігін және дозасын алғаш рет анықтау
B) тиімділігі мен қауіпсіздігін көп топта растау
C) тұрақтылығын анықтау
D) шағын топта тиімділік пен дозаны анықтау
E) тіркелгеннен кейін ұзақ бақылау
15. II фаза клиникалық зерттеулерінің мақсаты:
A) тиімділігі мен оңтайлы дозасын шектеулі топта анықтау
B) қауіпсіздік пен дозаны алғаш рет анықтау
C) тиімділікті үлкен топта растау
D) тұрақтылықты анықтау
E) тіркелгеннен кейін қауіпсіздікті бақылау
16. III фаза зерттеулерінің мақсаты:
A) тиімділік пен қауіпсіздікті үлкен топта растау
B) дозаны алғаш рет анықтау
C) тұрақтылық
D) кіші топтағы тиімділік
E) постмаркетингтік қауіпсіздік
17. IV фаза зерттеулерінің мақсаты:

A) препараттың қауіпсіздігін ұзақ бақылау
B) тиімділікті растау
C) қауіпсіздікті алғаш рет анықтау
D) тұрақтылық
E) оңтайлы доза
18. Алкоголь күшейтетін әсер:
A) ОЖЖ-ні тежейтін препараттар
B) ацетилсалицил қышқылы
C) диуретиктер
D) бүйрекпен шығарылатын препараттар
E) қақырық түсіргіштер
19. ОЖЖ-ні тежейтін дәрілер:
A) нейролептиктер
B) адаптогендер
C) ноотроптар
D) психостимуляторлар
E) актопротекторлар
20. Депрессияны емдеуде қолданылатындар:
A) амитриптилин және имизин
B) галоперидол және дроперидол
C) кофеин және этимизол
D) диазепам және нитразепам
E) валериана және пустырник
21. Бредтік синдромды емдеуде тиімді препарат:
A) галоперидол
B) хлордиазепоксид
C) диазепам
D) мезапам
E) нитразепам
22. Анксиолитиктің қажетті дозасының стандартталған өлшемі қалай аталады?
A) минималды терапиялық доза
B) бір реттік терапиялық доза
C) курстық доза
D) демеуші доза
E) токсикалық доза
23. Препараттың рецепторға байланысып, максималды әсер шақыру қабілеті қалай аталады?
A) тиімділік (эффикаси)
B) қуаттылық (потенция)
C) селективтілік
D) биожетімділік
E) аффинитет
24. Науқастың генетикалық ерекшелігіне байланысты пайда болатын жағымсыз реакция:
A) идиосинкразия
B) аллергия
C) токсиктік әсер
D) дозадан артық қолдану
E) жанама әсер
25. Қайталап қолданғанда дәрінің әсері төмендеуі қалай аталады?
A) толеранттылық
B) тәуелділік
C) сенсибилизация
D) токсикалық әсер
E) синергизм
26. Бір препараттың екіншісінің әсерін күшейтетін өзара әрекеттесу түрі:
A) синергизм
B) антагонизм

C) потенцирование
D) үйлеспеушілік
E) аддитивті әсер
27. Адреномиметиктерге жатады…
A) адреналин
B) атропин
C) пропранолол
D) метопролол
E) диазепам
28. Анафилактикалық шокта таңдау препараты:
A) адреналин
B) атропин
C) димедрол
D) преднизолон
E) папаверин
29. Морфин дозасын артық қабылдауда қолданылатын антидот:
A) налоксон
B) атропин
C) адреналин
D) унитиол
E) преднизолон
30. Шеткері әсер ететін ауырсынуды басатын зат:
A) ибупрофен
B) морфин
C) фентанил
D) промедол
E) диазепам
31. Температураны түсіру үшін қолданылатын ҚҚСП:
A) парацетамол
B) промедол
C) кетамин
D) морфин
E) фентанил
32. ҚҚСП-ның қауіпті жанама әсері:
A) асқазан-ішек қан кетуі
B) жөтел
C) брадикардия
D) тәбеттің жоғарылауы
E) іш қату
33. Парацетамолмен уланудың антидоты:
A) ацетилцистеин
B) атропин
C) унитиол
D) димедрол
E) витамин К
34. Айқын ұйқышылдық тудыратын I буын антигистамин:
A) димедрол
B) цетиризин
C) лоратадин
D) левоцетиризин
E) эриус
35. Автокөлік жүргізуге қауіпсіз II буын антигистамин:
A) лоратадин
B) димедрол
C) супрастин
D) тавегил

E) пипольфен
36. Диклофенак натрий қолданудың негізгі көрсеткіштері:
A) ревматизм, ревматоидты артрит, миозит, неврит
B) вирус инфекциясынан болған қызба
C) премедикация, операциядан кейінгі кезең
D) аллергиялық реакция
E) ЖИА-да тромбтың алдын алу
37. ҚҚСП-ға жататын препараттар:
A) ацетилсалицил қышқылы, бутадион, индометацин
B) гидрокортизон, преднизолон
C) кризанол, хингамин, метотрексат
D) димедрол, супрастин
E) кортикотропин, окситоцин
38. Мембраностабилиздеуші әсері бар қабынуға қарсы препарат:
A) интал
B) аспирин
C) индометацин
D) ибупрофен
E) пироксикам
39. Ревматоидты артритті ҚҚСП-мен емдеу ұзақтығы:
A) бірнеше ай
B) 1 ай
C) 1 апта
D) бір реттік қабылдау
E) 2 апта
40. Жүйелі қызыл жегіні емдеуде ең тиімді дәрілер:
A) глюкокортикоидтар
B) ҚҚСП
C) цитостатиктер
D) цефалоспориндер
E) сульфаниламидтер
41. Реополиглюкиннің шокқа қарсы әсерінен басқа қандай әсері бар?
A) қабынуға қарсы
B) қызу түсіргіш
C) иммунстимулдаушы
D) иммунодепрессивті
E) қан тоқтатушы
42. Фторхинолондардың нейротоксикалық әсерінің қаупін арттыратын препараттар:
A) ҚҚСП
B) метилксантинилер
C) А және С витаминдері
D) В1 және В6 витаминдері
E) пенициллиндер
43. Глюкокортикоидтардың қабынуға қарсы әсері немен байланысты?
A) липокортин синтезін реттеу арқылы фосфолипаза А2 тежелуі
B) рецепторларды бөгеп фосфолипаза А2 тежелуі
C) ЦОГ-1 тежелуі
D) ЦОГ-2 тежелуі
E) липооксигеназа тежелуі
44. Ацетилсалицил қышқылын қолдануға қарсы көрсеткіш:
A) геморрагиялық инсульт
B) миалгия, артралгия
C) қызба
D) ревматоидты артрит
E) миокард инфарктін алдын алу
45. Гепарин мен ацетилсалицил қышқылы бірге қолданғанда не болады?

A) антикоагулянттық әсер күшейеді
B) антикоагулянттық әсер әлсірейді
C) гипогликемиялық әсер күшейеді
D) гипотензивті әсер күшейеді
E) қызу түсіргіш әсер күшейеді
46. Ауыр гематологиялық асқынулар (нейтропения, агранулоцитоз, апластикалық анемия) тән препарат:
A) фенилбутазон
B) ибупрофен
C) сулиндак
D) кеторолак
E) набуметон
47. Радикулонейропатияны емдеуде қолданылады:
A) ҚҚСП және В витаминдері
B) цитостатика
C) глюкокортикоидтар
D) С және Е витаминдері
E) седативтер
48. ҚҚСП қолданғанда пайда болатын жоғары сезімталдық реакциялары (Квинке ісінуі, есекжем, аспирин астмасы) неге байланысты?
A) лейкотриендердің бөлінуі
B) аралық метаболиттердің бөлінуі
C) простагландиндердің бөлінуі
D) белсенді емес метаболиттердің бөлінуі
E) циклооксигеназа тежелуі
49. ҚҚСП мен гипотензивті препараттарды бірге қолданғанда соңғыларының әсері қалай өзгереді?
A) төмендейді
B) күшейеді
C) өзгермейді
D) бұрмаланады
E) бірінші препараттың жанама әсерін күшейтеді

Бағдарламаның 1 аралық бақылауға арналған ситуациялық сұрақтары

Құрастырушы: профессор м.а. Пернебекова Р.К.

Кафедра меңгерушісі:  профессор м.а. Токсанбаева Ж.С.

Хаттама: 

1. 30 жастағы, жүктілік мерзімі 12 апта болатын жүкті әйелде қауымнан тыс (внебольничная) пневмония диагнозы қойылды. Осы жағдайда ең қауіпсіз антибиотик қайсы?
A. Амоксициллин
B. Гентамицин
C. Левомицетин
D. Тетрациклин
E. Доксициклин
2. Пациентке изониазид профилактикалық мақсатта тағайындалды, себебі отбасы мүшесінің біреуі туберкулезбен ауырып жүр. Ем жүргізілгеніне қарамастан, пациентте изониазидке төзімді туберкулез дамыды. Резистенттіліктің даму механизмі қандай?
A. Каталаза кодтайтын ген экспрессиясының төмендеуі
B. Препараттың жасуша ішілік жиналуының төмендеуі
C. Препараттың N-ацетилтрансфераза арқылы инактивациясы
D. Миколин қышқылдарының синтезінің жоғарылауы
E. ДНҚ-тәуелді РНҚ-полимеразаны кодтайтын ген мутациясы

3. 7 жастағы бала 2 күн бойы қызбамен бірге жүретін фарингитпен ауырған. Микробиологиялық зерттеу бацитрацинге сезімтал, ұсақ, мөлдір β-гемолитикалық колонияларды анықтады. Бұрын құлақ инфекциясын емдеу кезінде балада амоксициллинге ауыр аллергиялық реакция болған. Дәрігер антибиотик тағайындауы керек, бірақ инъекция арқылы енгізілетін препаратты қолданғысы келмейді. Қай препарат ең тиімді әрі қауіпсіз?
A. Азитромицин
B. Цефаклор
C. Доксициклин
D. Пенициллин
E. Ванкомицин
4. Әйелде жыныстық жолмен берілетін ауру анықталды. Амбулаторлық жағдайда антибиотикотерапия тағайындалды. Оған ем кезінде алкоголь қабылдау жағымсыз реакцияларға әкелуі мүмкін екені ескертілді. Бұл антибиотик:
A. Метронидазол
B. Цефтриаксон
C. Доксициклин
D. Офлоксацин
E. Пенициллин
5. Поликлиникаға 15 жастағы жасөспірім тәбетінің төмендеуі, жүрек айну, құсу ұстамалары, іштің ауыруы шағымдарымен келді. Терапевт оған аскаридоз диагнозын қойды. Домалақ (нематод) құрттардан туындайтын көпшілік гельминтоздарға ең тиімді препарат қайсы?
A. Мебендазол
B. Хлорохин
C. Метронидазол
D. Празиквантел
E. Приметамин
6. 19 жастағы пациент маңдай–самай аймағының бас ауыруы, ретроорбитальды ауырсыну, сүйек ауруы шағымдарымен жеткізілді. Грипп диагнозы қойылып, осельтамивир («Тамифлю») тағайындалды. Оның вирусқа қарсы әсер ету механизмі — тежелуі:
A. Нейраминидаза
B. РНҚ-полимераза
C. Кері транскриптаза
D. Тимидинкиназа
E. Аспартатпротеаза
. «ВИЧ/СПИД» диагнозы бар пациентке кешенді антиретровирустық терапия тағайындалды. Біраз уақыттан кейін биохимиялық қан талдауында ұйқы безінің ферменттері — амилаза және липаза деңгейінің жоғарылауы анықталды. Бұл симптомдарды қай препарат тудырды?
A. Диданозин
B. Эритромицин
C. Изониазид
D. Зидовудин
E. Пиразинамид
8. Пациентте гүл тозаңына аллергиялық ринит бар, дәрігер седативті әсер жиі тудыратын препарат тағайындағысы келеді. Қай препаратты тағайындау ең тиімді?
A. Лоратадин
B. Бетаметазон
C. Циметидин
D. Гидроксизин
E. Метоклопрамид

Бағдарламаның 2 аралық бақылауға арналған бақылау сұрақтары

Құрастырушы: профессор м.а. Пернебекова Р.К.

Кафедра меңгерушісі: профессор м.а. Токсанбаева Ж.С.

Хаттама

1. Артериалық гипертензияны емдеуде бірінші қатардағы препараттар қандай?
2. Жүрек шығу тегіне байланысты ісіктерді емдеуде қандай диуретиктер қолданылады?
3. Қандай бета-блокаторлар кардиоселективті қасиетке ие?
4. Қандай препараттар III сынып антиаритмиктерге жатады?
5. Стенокардия шабуылын тоқтату үшін қандай дәрілер қолданылады?
6. Қандай препараттар АПФ ингибиторларына жатады?
7. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігінде жүрек соғу жиілігін азайту үшін қандай дәрілер қолданылады?
8. Гипертониялық дағдарысты емдеуде қандай препараттар пайдаланылады?
9. Ишемиялық жүрек ауруында тромбоздың алдын алу үшін қандай дәрілер тағайындалады?
10. Қандай препараттар кальций каналдары блокаторларына жатады?
11. Бронхиальды астма шабуылын тоқтату үшін қандай дәрілер қолданылады?
12. Қандай дәрілер ингаляциялық глюкокортикостероидтарға жатады?
13. Қандай препараттар лейкотриен рецепторларының антагонистері болып табылады?
14. Муколитикалық дәрілер ретінде қандай препараттар қолданылады?
15. Бронхиальды астманы ұзақ бақылауға алу үшін қандай дәрілер тағайындалады?
16. Қандай дәрілер холинолиттік бронходилятаторларға жатады?
17. ХОБЛ емдеуде таңдаулы препараттар қандай?
18. Қандай препараттар метилксантиндер тобына жатады?
19. Аллергиялық ринитті емдеуде қандай дәрілер тағайындалады?
20. Бронхиальды астма түнгі шабуылдарының алдын алу үшін қандай дәрілер қолданылады?
21. 2 типті қант диабетін емдеуде бірінші қатардағы препараттар қандай?
22. Қандай инсулиндер ультрақысқа әсерлі болып табылады?
23. андай препараттар сульфонилмочевина туындыларына жатады?
24. Гипотиреозды емдеуде қандай гормоналды препараттар қолданылады?
25. Гипертиреозды емдеуде қандай дәрілер пайдаланылады?
26. Аддисон ауруында қандай препараттар тағайындалады?
27. Гипогликемиялық жағдайларды емдеуде қандай дәрілер қолданылады?
28. Акромегалияны емдеуде қандай препараттар қолданылады?
29. Қандай препараттар тікелей антикоагулянттарға жатады?
30. Қандай дәрілер антиагреганттарға жатады?
31. Темір жетіспеушілігі анемиясын емдеуде қандай препараттар тағайындалады?
32. B12-дефицитті анемияны емдеуде қандай дәрілер қолданылады?
33. Қандай препараттар жаңа буынның (НОАК) ауыз арқылы қабылданатын антикоагулянттарына жатады?
34. Агранулоцитоз кезінде қандай дәрілер тағайындалады?
35. Қандай препараттар протон помпасының ингибиторларына жатады?
36. Helicobacter pylori байланысты гастритті емдеуде қандай антибиотиктер қолданылады?
37. Диареяны емдеуде қандай дәрілер пайдаланылады?
38. Қандай препараттар гепатопротекторларға жатады?
39. Панкреатикалық жеткіліксіздікті емдеуде қандай дәрілер қолданылады?

40. Гастроэзофагеальды рефлюкс ауруын емдеуде бірінші қатардағы препараттар қандай?

Бағдарламаның 2 аралық бақылауға арналған тест сұрақтары

Құрастырушы: профессор м.а. Пернебекова Р.К.

Кафедра меңгерушісі: _____ профессор м.а. Токсанбаева Ж.С.

Хаттама:

1. Адреноблокаторларға мыналар жатады…
A) пропранолол
B) адреналин
C) эфедрин
D) атропин
E) мезатон
2. β β-АЖЖ үшін қолданылатын адреноблокатор:
A) метопролол
B) адреналин
C) атропин
D) мезатон
E) димедрол
3. Гипертонияны емдеу үшін қолданылатын кальций антагонисті:
A) нифедипин
B) фуросемид
C) лизиноприл
D) каптоприл
E) атропин
4. Астма ұстамасын тоқтатуға арналған қысқа әсер ететін бета-2 адреномиметик:
A) салбутамол
B) атропин
C) адреналин
D) пропранолол
E) папаверин
5. Салбутамолдың жанама әсері:
A) тремор
B) іш қату
C) ұйқышылдық
D) брадикардия
E) есту галлюцинациясы
6. В-адренергиялық рецепторлардың антагонисті қарсы:
A) бронх демікпесі
B) гипертензия
C) тахикардия
D) стенокардия
E) гипертиреоз
7. 48 жастағы науқас в/в бронх демікпесінің ауыр шабуылын жеңілдету үшін преднизолон енгізді. Преднизолон... тобына жатады .
A. глюкокортикостероидтар
B. гестагендік препараттар
C. минералокортикоидтар
D. эстрогенді препараттар
E. анаболикалық стероидтер

8. Науқас S. pneumoniae штаммдарының кеңінен қолданылатын антибиотик ципрофлоксацинге төзімділігін дамытты. ... Резистенттілігін дамытудың механизмі .
A. топоизомеразаның оның ингибиторларына сезімталдығының төмендеуі
B. PABA синтезінің жоғарылауы
C. рецепторлық құрылымды өзгертетін метилтрансфераза түзілуі
D. пориндердегі құрылымдық өзгерістер
E. инактивациялайтын дәрілердің түзілуі-гидролаз

9. Бронх демікпесінің ұстамасы кезінде 54 жастағы науқас салбутамолды қолданды, нәтижесінде рефлекторлы тахикардия дамыды, бұл жанама әсерді ... енгізу арқылы азайтуға болады .
A. Метопролол
B. добутамина
C. празозина
D. фенилэфрин
E. төмен дозалы адреналин

10. Темір тапшылығы анемиясы бар темір препараттарымен емдеу курсы... .
A. бірнеше ай
B. 2 жыл
C. 1 апта
D. бір реттік қабылдау
E. 2 апта-1 ай

11. Ауызша темір препараттарының жанама әсерлері:... .
A. жүрек айнуы, іш қату, тіс эмальындағы қара тақта
B. анафилактикалық шок
C. бас ауруы, бас айналу
D. агранулоцитоз, эозинофилия
E. тахикардия, төс сүйегінің артындағы ауырсыну

12. Эпоэтинді қолдануға көрсеткіштер…
A. созылмалы бүйрек жеткіліксіздігімен байланысты анемия
B. темір тапшылығы анемиясы
C. мегалобластикалық анемия
D. зиянды анемия
E. жедел постгеморрагиялық анемия

13. Ұзақ әсер ететін темір препараты... болып табылады .
A. Ферро-градумент
B. феррум-лек
C. ферроплекс
D. ферамид
E. гемостимулин

14. Темірдің асқазан-ішек жолынан сіңуі және оның сіңуі С-ны бір мезгілде қабылдағанда жақсарады...
A. аскорбин қышқылы
B. В дәрумені 12
C. фолий қышқылы
D. натрий гидрокарбонаты
E. кромоглиций қышқылы

15. Эндемиялық зоб кезінде қолданылатын құралдарға мыналар жатады... .
A. мерказолил
B. тиамазол
C. эстрадиол
D. гидрокортизон
E. паратироидин

16. Қалқанша безінің гормоналды препараттарына жатады...
A. левотироксин
B. актрапид
C. эстрадиол
D. гидрокортизон
E. паратироидин

17. Құрылымы бойынша адам инсулиніне ең жақын -... .
A. гумулин
B. бұқа инсулині
C. шошқа инсулині
D. моносуинсулин
E. глибенкламид
18. Қысқа әсер ететін инсулин препараттарына жатады... .
A. еритін бейтарап инсулин
B. инсулин мырыш аморфты суспензия
C. изофан-инсулин протамині
D. инсулин-аминохинурид
E. инсулин мырыш кристалды суспензия
19. Орташа әсер ететін инсулин препараттарына жатады...
A. инсулин мырыш аморфты суспензия
B. инсулин мырыш кристалды суспензия
C. еритін бейтарап инсулин
D. лизпроинсулин
E. семилонг
20. Бигуанидтер тобынан ішілетін диабетке қарсы құрал болып табылады... .
A. буформ
B. глибенкламид
C. гликвидон
D. гликлазид
E. толбутамид
21. Жүкті әйелдердегі базальды ауруды емдеуде таңдау препараты болып табылады... .
A. пропилтиоурацил
B. калий йодиді
C. йод
D. радиоид
E. тиамазол
22. Қалқанша безінің гормондық терапиясы ең тиімді болып табылады... .
A. без тінінің атрофиясы
B. гипофиз микседемасы
C. жедел адреналды дағдарыстар
D. эндемиялық зоб
E. диффузды токсикалық зоб
23. Мерзімінен бұрын босану қаупі бар тиімді.. .
A. фенотерол
B. этинилэстрадиол
C. окситоцин
D. дезаминокситоцин
E. пропранолол
24. Денені жүрек гликозидтерімен қанықтыру процесі деп аталады... .
A. цифрландыру арқылы
B. анорексия
C. катетеризация арқылы
D. кардиоверсия
E. фибрилляция арқылы
25. Емдеу кезінде стенокардия алдын-ала жүктемені азайтады және кейінгі жүктемеге әсер етпейді...
A. бета-блокаторлар
B. нитроглицерин
C. кальций антагонистері
D. нитронг
E. нитросорбид
26. Глюкокортикоидтардың әсері... бір мезгілде қолданғанда төмендейді.
A. фенобарбитал және дифенин

B. эритромицин және салицилаттар
C. пенициллин және ампициллин
D. глюкоза және новокаин
E. натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісі
27. Глюкокортикоидтарды қолдану көрсеткіші... болып табылады .
A. ауыр артериялық гипотензия
B. қант диабеті
C. асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасы
D. ауыр жүрек жеткіліксіздігі
E. остеопороздың ауыр түрлері
28. Қан айналымы жеткіліксіздігінің бірінші кезеңінде емдеудің негізгі принципі... болып табылады .
A. дене салмағын қалыпқа келтіру, тұзды тұтынуды азайту
B. жүрек гликозидтерін тағайындау
C. диуретиктерді тағайындау
D. седативті терапия жүргізу
E. физиотерапиялық емдеу әдістерін қолдану
29. Жүрек жеткіліксіздігімен бірге жүретін артериялық гипертензия кезінде... қолданылады .
A. гидрохлортиазид
B. нифедипин
C. празозин
D. верапамил
E. моксонидин
30. Халықаралық зерттеулерге сәйкес, жүрек жеткіліксіздігі бар науқастардың өмір сүру ұзақтығы ҰБТ-ны арттырады .
A. ангиотензин өткізетін ферменттің ингибиторлары
B. жүрек гликозидтері
C. диуретиктер
D. кальций антагонистері
E. нитраттар
31. Балалардағы темір препараттарын ұзақ уақыт тағайындау кезінде ҰБТ дамуы мүмкін .
A. гипермиоглобинемия
B. рахита
C. эритроцитуриялар
D. есту қабілетінің төмендеуі
E. энтероколит
32. Темір препараттарын қолдану кезінде іш қату олардың ішекте... - мен байланысуы нәтижесінде пайда болады .
A. күкіртті сутегі
B. оттегімен
C. натрий хлориді
D. азот оксиді
E. ферменттер
33. Дипиридамолды... - мен қолдану ұсынылмайды .
A. ренни препаратымен
B. тиклопидинмен
C. ацетисалицил қышқылы
D. глюкоза
E. реополиглюкин
34. Аминокапрон қышқылын қолдану көрсеткіші... болып табылады .
A. тромбоэмболия
B. жедел панкреатит
C. цереброваскулярлық бұзылыс
D. бүйрек аурулары
E. жүктілік
35. Тыныс алу орталығына рефлекторлы әсер ететін препаратқа жатады ...
A. цититон
B. кордиамин

C. кофеин
D. камфора
E. бемегрид
36. Тыныс алу орталығын рефлекторлы ынталандыратын дәрілерге мыналар жатады ...
A. лобелин
B. кофеин
C. коразол
D. камфора
E. бемегрид
37. Бронходилататор әсері жоқ препараттар ...
A. резерпин
B. атропин
C. изадрин
D. адреналин
E. эуфиллин
38. Бронх демікпесінің шабуылын тоқтату үшін ... қолданбаңыз.
A. кодеин
B. атропин сульфаты
C. адреналин гидрохлориді
D. изадрин
E. эуфиллин
39. Қақырық түсіретін дәрілер ...
A. бромгексин
B. кодеин
морфин
C. кофеин
D. кордиамин
40. Бронх демікпесінде қолданылатын Препарат ...
A. эуфиллин
B. либексин
C. кофеин
D. глауцин
E. кодеин
41. Ингаляциялық жолмен енгізілетін Препарат ...
A. салбутамол
B. атропин
C. адреналин
D. эуфиллин
E. димедрол
42. М-бронхтарға селективті әсер ететін холиноблокатор....
A. ипратропий
B. платифиллин
C. метацин
D. пирензепин
E. атропин
43. Бронх пен жатырға селективті әсер ететін Бета-адреномиметик....
A. салбутамол
B. орипреналин
C. изопреналин
D. хромоглицин қышқылы
E. беклометазон
44. Муколитикалық болып табылады...
A. бромгексин
B. либексин
C. окселадин
D. мукалтин

Е. калий йодиді
45. Апоморфин ... .
A. допаминдік рецепторларды ынталандырады
B. серотонин рецепторларын блоктайды
C. ішке енгізіледі
D. анорексигенді агент ретінде қолданылады
E. құсуға қарсы агент ретінде қолданылады
46. Гастропротективті әрекет байланысты болуы мүмкін ... .
A. шырышты қабықтың бетінде қорғаныс қабатының пайда болуы
B. асқазан
C. асқазандағы хлорсутек қышқылының секрециясының төмендеуі
D. хлорсутек қышқылын бейтараптандыру арқылы
E. асқазан моторикасының әлсіреуі
F. асқазанда пепсин секрециясының төмендеуі
47. Гастропротектор болып табылады ... .
A. сукралфат
B. магний оксиді
C. ранитидин
D. атропин
E. метоклопрамид
48. Асқазанның шырышты қабығын механикалық қорғайды ... .
A. сукралфат
B. пирензепин
C. магний оксиді
D. омепразол
E. ранитидин
49. Асқазанның шырышты қабығының зақымдайтын факторларға төзімділігін арттырады ... .
A. мисопростол
B. прозерин
C. магний сульфаты
D. фамотидин
E. омепразол
50. Гастропротекторларға жатады ... .
A. Е тобындағы простагландиндердің препараттары
B. ранитидин
C. пирензепин
D. метоклопрамид
E. фенолфталеин

Бағдарламаның 2 аралық бақылауға арналған ситуациялық сұрақтары

Құрастырушы: профессор м.а. Пернебекова Р.К.

Кафедра меңгерушісі:_ _ профессор м.а. Токсанбаева Ж.С.

Хаттама:

1. Науқас К. 45 жаста, ауруханаға жөтелге шағымданып, аз мөлшерде қақырықты шығару қиын, жаттығу кезінде ентігу. Созылмалы бронхит диагнозы қойылды. Препарат тиімді...
A. тиотропия бромиді
B. натрий недохромил
C. фенотерол
D. монтелукаст
E. эуфиллин
2. Созылмалы бронхитпен ауыратын 70 жастағы ер адамға глауцин тағайындалды. Жөтел орталығының тежелуін қамтамасыз ететін механизмге мыналар жатады…

A. орталық әрекет
B. жанама әсері
C. басым әрекет
D. рефлекторлық әрекет
E. жергілікті әрекет

3. Бала 10 жаста, құрғақ жөтел бар. Дәрігер жөтелге есірткіге қарсы препаратты тағайындады. Бұл препарат…
A. глауцин гидрохлориді
B. кодеин фосфаты
C. морфин гидрохлориді
D. калий йодиді
E. зефир тамыры

4. Бронхитпен ауыратын науқасқа қақырық түсіретін дәрі тағайындалды, оны қабылдағаннан кейін бронхоспазм пайда болды. Бұл жанама әсер себеп болды...
A. ацетилцистеин
B. валидолом
C. салбутамол
D. платифиллин
E. либексин

5. Трахеитпен ауыратын науқастарға тыныс алуды тоқтатпайтын, тәуелділікті тудырмайтын және қан қысымын төмендететін орталық әсер ететін жөтелге қарсы препарат тағайындалды. Бұл препарат ...
A. глауцин
B. либексин
C. амброксол
D. морфин
E. кодеин

6. 35 жастағы әйел дәріханаға құрғақ жөтелге қарсы дәрі сатып алуға келді. Оған препарат ұсынылды...
A. либексин
B. амоксициллин
C. амброксол
D. лазолван
E. проспан

7. Өкпенің созылмалы обструктивті ауруымен ауыратын адамдарға ұзақ әсер ететін бета-2-адреномиметиктер тобынан препарат тағайындалды. Бұл препарат...
A. формотерол
B. фенотерол
C. салбутамол
D. тербуталин
E. гексопреналин

8. Бала тұншығу жағдайында дүниеге келді. Тыныс алуды ынталандыру үшін жаңа туған нәрестені енгізу керек…
A. этимизол
B. лобелин
C. празосин
D. атропин
E. прозерин

БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ
Аралық аттестаттауға арналған бағдарлама сұрақтары

Пәні: Фармакотерапия
Пән коды: Fart 2219
ББ шифры мен атауы: 6B10106 «Фармация»
Оқу сағаты/кредит көлемі: 5/150
Оқу курсы мен семестрі: 2 курс, 3 семестр

Құрастырған: профессор м.а. Пернебекова Р.К.

Кафедра меңгерушісі:_ профессор м.а. Токсанбаева Ж.С.

Хаттама:

<question>48 жастағы науқасқа ауыр бронх демікпесінің ұстамасын басу үшін, көк тамырға преднизолон енгізілді. Преднизолон ... гормондық дәрілер тобына жатады.
<variant> глюкокортикостероидтар
<variant> гестагенді препараттар
<variant> минералокортикоидтар
<variant> эстрогенді препараттар
<variant> анаболикалық стероидтар
<question >Науқаста кең қолданылатын ципрофлоксацин антибиотигіне S.pneumoniae штаммының резистенттілі пайда болды. Резистенттіліктің даму механизмі негізінде... жатыр.
<variant> топоизомеразаның ингибиторларына сезімталдығының төмендеуі
<variant> РАВА синтезінің жоғарылауы
<variant> рецепторлардың құрылымын өзгертетін метилтрансферазалардың түзілуі
<variant> пориндердегі құрылымдық өзгерістер
<variant> инактивациялаушы дәрілік гидролазаларды қалыптастыру
<question >54 жастағы науқас бронх демікпесі ұстамасында сальбутамолды қолданған, соның салдарынан рефлекторлы тахикардия дамыды. Бұл жанама әсерді...енгізу арқылы төмендету мүмкін.
<variant> метопрололол
<variant> добутамин
<variant> празозин
<variant> фенилэфрин
<variant> төмен дозалы адреналин
<question > Темір жетіспеушілік анемияда темір препараттарының қолдану ұзақтығы... болу керек.
<variant> бірнеше ай
<variant> 2 жыл
<variant> 1 апта
<variant> бір реттік қабылдау
<variant> 2 апта-1 ай
<question > Ішке қолданылатын темір препараттарының жанама әсерлеріне... жатады.
<variant> жүрек айну, іш қату және тістердің қараюы
<variant> анафилактикалық шок
<variant> бас ауры және бас айналу
<variant> агранулоцитоз және эозинофилия
<variant> тахикардия және кеуде тұсының ауруы
<question > Эпоэтиннің қолдану көрсеткіштеріне... жатады.
<variant> созылмалы бүйрек жетімсіздігінде болатын анемиялар
<variant> темір жетіспеушілік анемия
<variant> мегалобласттық анемия
<variant> пернициозды анемия
<variant> жедел постгеморрагиялық анемия
<question > Ұзақ уақыт әсер ететін темір препараттарына... жатады.
<variant> ферро-градумент
<variant> феррум-лек
<variant> ферроплекс
<variant> ферамид
<variant> гемостимулин
<question > Асқазан- ішек жолдарында темірдің сіңірілуін... жоғарылатады.
<variant> аскорбин қышқылы
<variant> В 12 витамин
<variant> фолий қышқылы
<variant> натрий гидрокарбонаты
<variant> кромоглиций қышқылы
<question > Мегалобласттық анемияны емдеу үшін негізгі препаратқа... жатады.
<variant> цианокобаламин
<variant> темір препараттары

<variant> эритропоэтин препараттары
<variant> В 6 витамині
<variant> ұзақ әсерлі темір препараттары
<question > Мегалобластық анемияны емдеу үшін негізгі препаратқа... жатады.
<variant> фолий қышқылы
<variant> эритропоэтин препараттары
<variant> В1 витамині
<variant> темір препараттары
<variant> ұзақ әсерлі темір препараттары
<question > Хумулин... жатады.
<variant> инсулин препараттарына
<variant> анаболикалық стероидтарға
<variant> пероральды диабетке қарсы дәрілеріне
<variant> гипофиздің алдыңғы бөлігінің дәрілеріне
<variant> антиандрогенды дәрілеріне
<question > Эндемиялық зобта қолданатын дәрілерге ... жатады.
<variant> меркозолил
<variant> тиамазол
<variant> эстрадиол
<variant> гидрокортизон
<variant> паратиреоидин
<question > Қалқанша безінің гормондық препараттарына... жатады.
<variant> левотироксин
<variant> актрапид
<variant> эстрадиол
<variant> гидрокортизон
<variant> паратиреоидин
<question > Адам инсулинінің құрылымына... жақын болып келеді.
<variant> хумулин
<variant> өгіз инсулині
<variant> шошқа инсулині
<variant> моносуинсулин
<variant> глибенкламид
<question > Қысқа уақыт әсер ететін инсулин препараттарына... жатады.
<variant> нейтралды ерігіш инсулин
<variant> аморфты инсулин цинк суспензиясы
<variant> изофан-протамин инсулин
<variant> инсулин-аминохинурид
<variant> кристалдық инсулин цинк суспензиясы
<question > Орташа уақыт әсер ететін инсулин препараттарына... жатады.
<variant> аморфты инсулин цинк суспензиясы
<variant> изофан-протамин инсулин
<variant> инсулин-аминохинурид
<variant> кристалдық инсулин цинк суспензиясы
<variant> семилонг
<question > Бигуанид тобындағы пероральды диабетке қарсы дәрілерге... жатады.
<variant> буформин
<variant> глибенкламид
<variant> гликвидон
<variant> гликлазид
<variant> толбутамид
<question > Жүктілік кезінде базедов ауруын емдеу үшін негізгі препарат... болып табылады.
<variant> пропилтиоурацил
<variant> калий иодиді

<variant> йод
<variant> радиойоды
<variant> тиамазол
<question > Қалқанша безінің гормондық препараттары... тиімді болып табылады.
<variant> без ұлпаларының атрофиясында
<variant> гипофизарлық микседемада
<variant> жедел адренал кризінде
<variant> эндемиялық зобында
<variant> диффузды токсикалық зобында
<question > Алдын-ала туу қаупі кезіндегі тиімді дәрі.. болып табылады.
<variant> фенотерол
<variant> этинилэстрадиол
<variant> окситоцин
<variant> дезаминоокситоцин
<variant> пропранолол
<question > Жүрек гликозидтерімен ағзаның қанығуы «...» деп аталады.
<variant> дигитализация
<variant> анорексия
<variant> катетеризация
<variant> кардиоверсия
<variant> фибрилляция
<question > Стенокардияны емдегенде... алдыңғы жүктемені төмендетеді, бірақ кейінгі жүктемеге әсер етпейді.
<variant> бета-адреноблокаторлар
<variant> нитроглицерин
<variant> кальций антагонистері
<variant> нитронг
<variant> нитросорбид
<question > Глюкокортикоидармен бірге қолданғанда әсері төмендейтін препараттарға ... жатады.
<variant> фенобарбитал мен дифениннің
<variant> эритромицин мен салицилаттың
<variant> пенициллин мен ампициллиннің
<variant> глюкоза мен новокаинның
<variant> натрий хлоридының изотоникалық ерітндісінің
<question > Глюкокортикоидтардың қолдану көрсеткішіне... жатады.
<variant> ауыр артериальды гипотензия
<variant> қант диабеті
<variant> асқазан мен он екі елі ішектің жара ауруы
<variant> ауыр жүрек жетіспеушілігі
<variant> остеопороздың ауыр түрлері
<question > Қан айналымының бірінші сатысында емнің негізгі ұстанымдары ... болып табылады.
<variant> салмақтың қалыпқа келуі, тұзды қолдануды төмендету
<variant> жүрек гликозидтерін тағайындау
<variant> диуретиктерді тағайындау
<variant> седативті терапияны жүргізу
<variant> физиотерапевтикалық емдеу әдістерін қолданады.
<question> Жүрек жетіспеушілігімен жүретін артериальды гипертензияда... қолданады.
<variant> гидрохлортиазид
<variant> нифедипин
<variant> празозин
<variant> верапамил
<variant> моксонидин
<question > Халықаралық зертеулер бойынша жүрек жетіспеушілігі бар науқастардың өмір ұзақтығын... жоғарылатады.

<variant> ангиотензин айналдырушы ферментті ингибирлеушілер
<variant> жүрек гликозидтері
<variant> диуретиктер
<variant> кальций антагонистері
<variant> нитраттар
<question > Балаларда темір препараттарын ұзақ қолданғанда... дамуы мүмкін.
<variant> гипермиоглобинемия
<variant> рахит
<variant> эритроцитурия
<variant> естудің төмендеуі
<variant> энтероколит
<question > Темір препараттарын қолданғанда іш қату ішекте олардың... байланысуынан дамиды.
<variant> күкіртсутекпен
<variant> оттегімен
<variant> натрий хлоридімен
<variant> азот тотығымен
<variant> ферменттермен
<question > Дипиридамолды... бірге қолдануға болмайды.
<variant> ренни препаратымен
<variant> тиклопидинмен
<variant> ацетисалицил қышқылымен
<variant> глюкозамен
<variant> реополиглюкинмен
<question > Аминокапрон қышқылын қолданатын көрсеткіш ... .
<variant> тромбоэмболия
<variant> жедел панкреатит
<variant> ми қанайналымы бұзылысы
<variant> бүйрек аурулары
<variant> жүктілік
<question>Тыныс алу орталығына рефлекторлы әсер көрсететін препаратқа … жатады.
<variant>цититон
<variant>кордиамин
<variant>кофеин
<variant>камфора
<variant>бемегрид
<question>Рефлекторлы әсерлі тыныс алуды қуаттандыратын дәріге … жатады.
<variant>лобелин
<variant>кофеин
<variant>коразол
<variant>камфора
<variant>бемегрид
<question>Бронхолитикалық әсер көрсетпейтін препаратқа ... жатады.
<variant>резерпин
<variant>атропин
<variant>изадрин
<variant>адреналин
<variant>эуфиллин
<question>Бронх демікпесінің ұстамасын басу үшін ... қолданбайды.
<variant>кодеинді
<variant>атропин сульфатын
<variant>адреналин гидрохлоридін
<variant>изадринді
<variant>эуфиллинді
<question>Қақырықты түсіретін препаратқа ... жатады.

<variant>бромгексин
<variant>кодеин
<variant>морфин
<variant>кофеин
<variant>кордиамин
<question>Бронх демікпесінде қолданатын препаратқа ... жатады.
<variant>эуфиллин
<variant>либексин
<variant>кофеин
<variant>глауцин
<variant>кодеин
<question>Ингаляциялық жолмен енгізілетін препарат ... болып табылады.
<variant>сальбутамол
<variant>атропин
<variant>адреналин
<variant>эуфиллин
<variant>димедрол
<question>Бронхтарға таңдамалы әсер ететін М-холиноблокатор... болып табылады.
<variant>ипратропиум
<variant>платифиллин
<variant>метацин
<variant>пирензепин
<variant>атропин
<question>Бронхтар мен жатырға таңдамалы әсер ететін бета-адреномиметик ... болып табылады.
<variant>сальбутамол
<variant>орципреналин
<variant>изопреналин
<variant>кромоглиций қышқылы
<variant>беклометазон
<question>Муколитиктерге ... жатады.
<variant>бромгексин
<variant>либексин
<variant>окселадин
<variant>мукалтин
<variant>калий йодиді
<question>Науқаста қою тұтқыр қақырығы бар жіті бронхит. Оған ... қолдану көрсетілген.
<variant>мукоактивті препараттар
<variant>глюкокортикостероидтар
<variant>антикоагулянттар
<variant>адаптогендер
<variant>ноотропты препараттар
<question>Науқас К. 45 жаста, ауруханаға аз мөлшерде қиын бөлінетін қақырық бар жөтелге, физикалық жүктеме кезінде ентігуге шағыммен түсті. «Созылмалы бронхит» диагнозы қойылды. Тиімді препарат ... болып табылады.
<variant>тиотропий бромиді
<variant>натрий недокромилі
<variant>фенотерол
<variant>монтелукаст
<variant>эуфиллин
<question>Созылмалы бронхитпен ауыратын 70 жастағы ер адамға глауцинге қарсы препарат тағайындалған. Жөтел орталығының тежеуін қамтамасыз ететін механизміне ... жатады.
<variant>орталық әсер
<variant>шеткі әсер
<variant>бәсекелестік әсер

<variant>рефлекторлық әсер
<variant>жергілікті әсер
<question>Көкжөтел ауруына қарсы орталық әсерлі препарат тағайындалды. Бұл препарат ... болып табылады.
<variant>глауцин
<variant>либексин
<variant>терпингидрат
<variant>калий йодиді
<variant>бромгексин
<question>10 жас балада құрғақ жөтел байқалады. Дәрігер жөтелге қарсы наркотикалық емес әсері бар дәрі тағайындады. Бұл препаратқа... жатады.
<variant>глауцин гидрохлориді
<variant>кодеин фосфаты
<variant>морфин гидрохлориді
<variant>калий йодиді
<variant>дәрілік алтей тамыры
<question>Бронхитпен ауыратын науқасқа қақырық түсіретін дәрілік зат тағайындалды, оны қабылдағаннан кейін бронхоспазм пайда болды. Бұл жанама әсерді ... тудырды.
<variant>ацетилцистеин
<variant>валидол
<variant>сальбутамол
<variant>платифиллин
<variant>либексин
<question>Трахеитпен ауыратындарға орталық әсер ететін жөтелге қарсы дәрі тағайындалды, ол тыныс алуды тоқтатпайды, дәріге тәуелділікті тудырмайды, артериялық қысымды төмендетеді. Бұл препарат ... болып табылады.
<variant>глауцин
<variant>либексин
<variant>амброксол
<variant>морфин
<variant>кодеин
<question>Дәріханаға 35 жастағы әйел құрғақ жөтелді жою үшін дәріні сатып алу мақсатында келді. Оған ... дәрісі көрсетілді.
<variant>либексин
<variant>амоксициллин
<variant>амброксол
<variant>лазолван
<variant>проспан
<question>Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы бар науқастарға бета-2-ұзақ әсер ететін адреномиметиктер тобының препараты тағайындалды. Бұл препарат ... болып табылады.
<variant>формотерол
<variant>фенотерол
<variant>сальбутамол
<variant>тербуталин
<variant>гексопреналин
<question>Бала асфиксия жағдайында туылған. Жаңа туған нәрестеге тыныс алуды ынталандыру үшін ... енгізу қажет.
<variant>этимизол
<variant>лобелин
<variant>празозин
<variant>атропин
<variant>прозерин
<question>Бронхиті бар науқасқа мукоактивті препарат тағайындалды. Оларға ... жатады.
<variant>амброксол

<variant>будесонид
<variant>беклометазон
<variant>флютиказон
<variant>эуфиллин
<question>Науқаста жыпылықтайтын аритмияның тахисистолиялық түрі бар. Таңдау препараты ... болып табылады.
<variant>метопролол
<variant>каптоприл
<variant>дефибрилляция
<variant>нифедипин
<variant>фозикард
<question>Стенокардия ұстамасын басу үшін қолданылатын препаратқа ... жатады.
<variant>нитроглицерин
<variant>валидол
<variant>нифедипин
<variant>изосорбид динитраты
<variant>нитронг
<question>Стенокардияны емдеу кезінде таңдамалы болып ... саналады.
<variant>нитраттар
<variant>рефлекторлы әсерлі тәж кеңейтетін дәрілер
<variant>бета-адреноблокаторлар
<variant>кальций антагонистері
<variant>миотропты спазмолитиктер
<question>Миокард инфарктында .... тағайындайды.
<variant>наркотикалық анальгетиктерді
<variant>дибазолды
<variant>папаверинді
<variant>антифибринолитиктерді
<variant>гемостатиктерді
< question> Стенокардияны емдеудегі селективті блокатор ...
<variant > метопролол
<variant > пропранолол
<variant > окспренолол
<variant > резерпин
<variant > октадин
<question>Кальций антагонистер тобындағы антиангинальды дәрілік құралға ... жатады.
<variant>нифедипин
<variant>циннаризин
<variant>верапамил
<variant>никардипин
<variant>дилтиазем
<question>Органикалық нитраттар тобындағы әсері ұзақ препарат ... болып табылады.
<variant>нитронг
<variant>нитроглицерин
<variant>сустак
<variant>тринитролонг
<variant>натрии нитраты
< question > Кардиоселективті бета блокаторы ...
< variant > атенолол
< variant > надолол
< variant > пропранолол
< variant > окспренолол
< variant >пиндолол
<question>Кардиоселективті емес бета-адреноблокаторлар тобына ... жатады.

<variant>пропранолол
<variant>метопролол
<variant>талинолол
<variant>атенолол
<variant>бисопролол
<question>Миокард инфарктында фармакотерапияның негізгі ұстанымдарына ... жатады.
<variant>ауырсынуды басу
<variant>дене температурасын төмендету
<variant>тромбқа қарсы ем жүргізу
<variant>гипертонияны емдеу
<variant>қабаттасқан қант диабетін емду
<question>Нитроглицеринді қабылдағаннан кейін бастың ауруында ... жөн.
<variant>препаратты сол сызба бойынша жалғастырған
<variant>препаратты қабылдауды тоқтатқан
<variant>аспирин таблеткасын қабылдаған
<variant>препаратты алмастырған
<variant>препараттың мөлшерін жоғарылатқан
<question>Стенокардияның ұстамасын жоюда нитроглицериннің әсерінің болмауы .. білдіреді.
<variant>миокардт инфарктыны
<variant>тұрақсыз стенокардияны
<variant>күш түсу стенокардиясын
<variant>жүрек жетімсіздігін
<variant>гипотонияны
<question>Стенокардияны емдеуде әсері ұзартылған нитраттардың әсері төмендегенде ... керек.
<variant>емдеуде үзіліс жасау
<variant>аспиринді тағайындау
<variant>физиотерапия жүргізу
<variant>препараттан бас тарту
<variant>аортотәждік шунттау операциясын жасау
<question>Инфарктыда .. тағайындалады.
<variant>морфин
<variant>резерпин
<variant>клофелин
<variant>аминобензой қышқылы
<variant>коагулянт
<question>Миотропты әсерлі тәж кеңейтетін дәрілерге ... жатады.
<variant>дипиридамол
<variant>валидол
<variant>амиодарон
<variant>изосорбид мононитраты
<variant>дилтиазем
<question>Стенокардияны емдеуде ... қиыстырған тиімді.
<variant>нитраттар мен аспиринді
<variant>нитраттар мен кордиаминді
<variant>нитраттар мен резерпинді
<variant>нитраттар мен папаверинді
<variant>нитраттар мен клофелинді
<question>Миокардтың қанмен жабдықталуын ... жақсартады.
<variant>дипиридамол
<variant>анаприлин
<variant>атенолол
<variant>метопролол
<variant>резерпин
<question>Қысқа әсер ететін ангиотензин айналдырушы фермент тежегіштеріне... жатады.

<variant>каптоприл
<variant>эналаприл
<variant>лизиноприл
<variant>беназеприл
<variant>рамиприл
<question>Гиперальдостеронизммен байланысты артериялық гипертензияны емдеу үшін ... таңдайды.
<variant>спиронолактонды
<variant>гидрохлортиазидті
<variant>пропранолды
<variant>клонидинді
<variant>резерпинді
<question>Гипертониялық криздің алдын- алу және емдеу үшін ... қолданады.
<variant>метопрололды ішке
<variant>кордиаминді ішке
<variant>кордаронды ішке
<variant>магний сульфатын ішке
<variant>натрий нитропруссидін ішке <question>Гипертензия белгілері бар науқасты тексеру кезінде оған АПФ тежегіш препаратты қолдану орынды екендігі анықталды. Бұл дәрі- ... .
<variant>лизиноприл
<variant>анаприлин
<variant>апресин
<variant>октадин
<variant>дибазол
<question > Ангиопротекторлардың тобына... жатады.
<variant> дицинон
<variant> витамин К
<variant> дипиридамол
<variant> аминокапрон қышқылы
<variant> неодикумарин
<question > Кромогликаттарды қолданғанда тұрақты терапевтикалық әсер... пайда болады.
<variant> үнемі қолданғанда 1 айдан кейін
<variant> бірден
<variant> үнемі қолданғанда 1 аптадан кейін
<variant> жарты жылдың ішінде
<variant> бір жылда
<question > Астматикалық статустың фармакотерапиясы... енгізуінен басталуы керек.
<variant> эуфиллинді
<variant> глюкокортикоидтардың үлкен дозасын
<variant> ипратропиум бромидін
<variant> фентоламинді
<variant> бета-адреномиметиктерді
<question > Антихеликобактерлік әсері бар, асқазан мен ішек шырышты қабығын қорғайтын препараттарға... жатады.
<variant> висмут субцитраты
<variant> сукральфат
<variant> мизопростол
<variant> карбеноксолон
<variant> ранитидин
<question > Асқазан мен он екі елі ішектің жара ауруында монотерапия түрінде... қолданылады.
<variant> ранитидин мен фамотидин және пилорид
<variant> омепразол мен пирензепин және маалокс
<variant> сукральфат мен тетрациклин және циметидин
<variant> метронидазол мен тетрациклин және маалокс
<variant> метронидазол мен кларитромицин және тетрациклин

<question > Эрадикациялық терапияның ұзақтығы... болады.
<variant> 7-14 күн
<variant> 5-6 күн
<variant> 15-20 күн
<variant> 1 ай
<variant> 6 ай
<question > Сүт секрециясын реттейтін гормондарға... жатады.
<variant> пролактин
<variant> тестостерон
<variant> соматотропин
<variant> альдостерон
<variant> тиротропин
<question > Сүт секрециясын жоғарылататын препараттарға... жатады.
<variant> лактин, дезаминоокситоцин
<variant> бромокриптин және лизурид
<variant> папаверин және но-шпа
<variant> аскорбин қышқылы және глюкоза
<variant> Е витамині және глюконаттар
<question > Жүктілікте С витаминінің жетіспеушілігі... шақыртады.
<variant> жүктіліктің үзілуін
<variant> катарактаның және микрофтальмияның дамуын
<variant> балада рахиттың дамуын
<variant> токсикозды
<variant> даму ақауларын
<question > В6 гиповитаминозы жүкті әйелдерде... шақыртады.
<variant> токсикоздың пайда болуын
<variant> катарактаның және микрофтальмияның дамуын
<variant> балада рахиттың дамуын
<variant> жүктіліктің үзілуін
<variant> даму ақауларын
<question > Д гиповитаминозы жүкті әйелдерде... шақыртады.
<variant> балада рахиттың дамуын
<variant> катарактаның және микрофтальмияның дамуын
<variant> токсикоздың пайда болуын
<variant> жүктіліктің үзілуін
<variant> даму ақауларын
<question > Апоморфин...
<variant> дофаминді рецепторларды қуаттандырады
<variant> серотонинді рецепторларды тежейді
<variant> ішке қолданылады
<variant> анорексигенді дәрі ретінде қолданылады
<variant> құсыққа қарсы дәрі ретінде қолданылады
<question > Гастропротекторлы әсер ..... байланысты болуы мүмкін.
<variant> асқазан шырышты қабатының бетінде қорғаныс қабатын түзілуіне
<variant> асқазанда хлорлы сутек қышқылы секрециясының азаюына
<variant> хлорлы сутек қышқылының бейтараптануына
<variant> асқазан моторикасының әлсізденуіне
<variant> асқазанда пепсин секрециясының азаюына
<question > Гастропротекторге ... жатады.
<variant> сукралфат
<variant> магний тотығы
<variant> ранитидин
<variant> атропин
<variant> метоклопрамид

<question > Асқазан шырышты қабығын ... механикалық қорғайды.
<variant> сукралфат
<variant> пирензепин
<variant> магний тотығы
<variant> омепразол
<variant> ранитидин
<question > Зақымдаушы факторларға асқазан шырышты қабығын .... жоғарылатады.
<variant> мизопростол
<variant> прозерин
<variant> магний сульфаты
<variant> фамотидин
<variant> омепразол
<question > Гастропротекторларға ... жатады.
<variant> Е тобының простагландиндер препараттары
<variant> ранитидин
<variant> пирензепин
<variant> метоклопрамид
<variant> фенолфталеин
<question > Мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру бойынша сатып алуға арналған эффективті және сенімді дәрілердің тізімі «...» деп аталады.
<variant> негізгі дәрілердің тізімі (өмірлік маңызды)
<variant> дәрілердің мемлекеттік реестрі
<variant> дәрілердің номенклатурасы
<variant> дәріхана рецептурасы
<variant> фармакопея
<question > Фармакотерапияның мақсаттарына ... жатады.
<variant> толық емделу
<variant> жартылай емделу
<variant> өмір сапасының төмендеуі
<variant> өмір деңгейінің жоғарылауы
<variant> ауру қаупінің төмендеуі
<question > Дәрілік заттан қанның тазару және оның ағзадан шығарылу жылдамдығы «...» деп аталады.
<variant> клиренс
<variant> жартылай шығарылу кезеңі
<variant> дәрінің биосіңімділігі
<variant> элиминация
<variant> біріншілік өту эффектісі
<question >Дәріні ұзақ қолданғанда ішек микрофлорасының бұзылуы «...» деп аталады.
<variant> дисбактериоз
<variant> аллергиялық реакция
<variant> доғару синдромы
<variant> идиосинкразия
<variant> дәріге тәуелділік
<question >Ағазада қандай да бір өзгерістің нәтижесінде фармакологиялық белсенділікке ие болатын зат «...» деп аталады.
<variant> дәрінің ізашары
<variant> дәрілік құрал
<variant> плацебо
<variant> прекурсор
<variant> депо-дәрі
<question > Дәрілік заттардың терапевтикалық мониторингіне .... жатады.
<variant> қандағы дәрілік заттың концентрациясын үнемі қадағалау
<variant> науқаста дәрінің метаболизмінің жолын анықтау
<variant> дәрінің әсерінің метаболизмінің анықтау

<variant> дәрінің әсерінің таңдамалылығын анықтау
<variant> дәрілердің сіңірілуіне тамақтың ықпалын анықтау
<question > Материалды кумуляцияны ... шақырады.
<variant> дигитоксин
<variant> строфантин
<variant> альбумин
<variant> этиленгликоль
<variant> налоксон
<question >Туберкулезбен ауыратын науқаста изониазидті терапияға жағымсыз жанама әсерлер пайда болды. Ол пациентте «баяу ацетилятор» екендігін анықтайтын сынақ жасалынды. Дәрілерге ағзаның сезімталдығының тұқым қуалайтын шартты айырмашылықтарын зерттейтін ғылым ... деп аталады.
<variant> фармакогенетика
<variant> фармакодинамика
<variant> фармакокинетика
<variant> фармакология
<variant> клиникалық фармакология
<question > GCP (Good Clinical Practice) - ... реттейтін халықаралық ережелердің кодексі.
<variant> сапалы клиникалық практиканы
<variant> сапалы лабораториялық практиканы
<variant> дәрілердің сапалы өндірісін
<variant> дәрілерді сатудың сапасын
<variant> дәрілердің сапалы тағайындалуын
< question> Зерттеу демеушісінің міндеттеріне ... кіреді.
< variant> клиникалық зерттеулерді қаржыландыру және басқару
< variant> клиникалық зерттеу жұмысын жүргізу
< variant> қатысушылардан ақпараттандырылған келісім алу
<variant > деректерді талдауды орындау
<variant> қорытындылауды ұйымдастыру
<question > Күтпеген өлімге әкелетін немесе өмірге қауіп төндіретін елеулі жағымсыз оқиға демеушіге .. күнтізбелік күн ішінде хабарлануы тиіс.
<variant> 7
<variant> 5
<variant> 15
<variant> 24
<variant> 30
<question> Клиникалық зерттеудің I фаза зерттеулеріне ... адамдар қатысады.
<variant> дені сау ерікті
<variant> белгілі ауруы бар науқас
<variant> нақты ауруы бар науқас
<variant> тек әйелдер
<variant> тек балалар
<question> Клиникалық зерттеудің I фазасының негізгі мақсаты... .
<variant> Препараттың қауіпсіздігін, тиімділігін және дозасын алғаш рет анықтау
<variant> Препараттың тиімділігі мен қауіпсіздігін үлкен науқастар тобына дәлелдеу
<variant> Препараттың тұрақтылығын фармацевтикалық тұрғыдан анықтау
<variant> Препараттың тиімділігі мен оңтайлы дозасын шектеулі науқастар тобында анықтау
<variant> Препараттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін және сирек жанама әсерлерін ұзақ мерзімде бақылау
<question> Клиникалық зерттеудің II фазасының негізгі мақсаты... .
<variant> Препараттың тиімділігі мен оңтайлы дозасын шектеулі науқастар тобында анықтау
<variant> Препараттың қауіпсіздігін, тиімділігін және дозасын алғаш рет анықтау
<variant> Препараттың тиімділігі мен қауіпсіздігін үлкен науқастар тобына дәлелдеу
<variant> Препараттың тұрақтылығын фармацевтикалық тұрғыдан анықтау

<variant> Препараттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін және сирек жанама әсерлерін ұзақ мерзімде бақылау
<question> Клиникалық зерттеудің III фазасының негізгі мақсаты... .
<variant> Препараттың тиімділігі мен қауіпсіздігін үлкен науқастар тобына дәлелдеу
<variant> Препараттың қауіпсіздігін, тиімділігін және дозасын алғаш рет анықтау
<variant> Препараттың тұрақтылығын фармацевтикалық тұрғыдан анықтау
<variant> Препараттың тиімділігі мен оңтайлы дозасын шектеулі науқастар тобында анықтау
<variant> Препараттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін және сирек жанама әсерлерін ұзақ мерзімде бақылау
<question> Клиникалық зерттеудің IV фазасының негізгі мақсаты.. .
<variant> Препараттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін және сирек жанама әсерлерін ұзақ мерзімде бақылау
<variant> Препараттың тиімділігі мен қауіпсіздігін үлкен науқастар тобына дәлелдеу
<variant> Препараттың қауіпсіздігін, тиімділігін және дозасын алғаш рет анықтау
<variant> Препараттың тұрақтылығын фармацевтикалық тұрғыдан анықтау
<variant> Препараттың тиімділігі мен оңтайлы дозасын шектеулі науқастар тобында анықтау
<variant> Препараттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін және сирек жанама әсерлерін ұзақ мерзімде бақылау
<question > Алкоголь ... әсерін күшейтеді.
<variant> орталық жүйке жүйесін тежейтін дәрілердің
<variant> ацетилсалицил қышқылының
<variant> несеп айдайтын дәрілердің
<variant> бүйрек арқылы шығарылатын дәрілердің
<variant> қақырық айдайтын дәрілердің
<question > Орталық жүйке жүйесіне тежегіш әсер көрсететін дәрілерге... жатады.
<variant> нейролептиктер
<variant> адаптогендер
<variant> ноотропты препараттар
<variant> психоқуаттандырғыштар
<variant> актопротекторлар
<question > Депрессияны емдеу үшін... қолданылады.
<variant> амитриптилин және имизин
<variant> галоперидол және дроперидол
<variant> кофеин және этимизол
<variant> диазепам және нитразепам
<variant> шүйгіншөп және сасық шөп препараттары
<question > Сандырақ синдромдарды емдеу үшін... тиімді.
<variant> галоперидол
<variant> хлордиазепоксид
<variant> диазепам
<variant> мезапам
<variant> нитразепам
<question > Галлюцинацияларды емдеу үшін... тиімді.
<variant> трифтазин
<variant> диазепам
<variant> пирацетам
<variant> актовегин
<variant> кофеин
<question > Нейролептиктердің жанама әсерлеріне... жатады.
<variant> экстрапирамидтік бұзылыстар
<variant> артериялық қысымның жоғарылауы
<variant> гиперсаливация және диарея
<variant> психоқуаттандырғыш әсер
<variant> құсықты шақыртатын әсер

<question > Психомоторлық қозуды тез жою үшін... қолданылады.
<variant> дроперидол
<variant> галоперидол
<variant> модитен-дело
<variant> литий карбонаты
<variant> хлордиазепоксид
<question > Дәрілердің әсерінің нәтижесінде өнімді психоз белгілерінің азаюы... әсерге байланысты.
<variant> нейролептикалық
<variant> анксиолитикалық
<variant> седативті
<variant> антидепрессивті
<variant> ноотропты
<question > Дәрілердің әсерінің нәтижесінде эмоционалды кернеуінің азаюы... әсерге байланысты.
<variant> анксиолитикалық
<variant> нейролептикалық
<variant> седативті
<variant> антидепрессивті
<variant> ноотропты
<question > Дәрілердің әсерінің нәтижесінде патологиялық түрінде төмендеген көңіл-күйдің жақсаруы... әсерге байланысты.
<variant> антидепрессивті
<variant> нейролептикалық
<variant> седативті
<variant> ноотропты
<variant> анксиолитикалық
<question > Психоқуаттандырғыштарға... жатады.
<variant> сиднокарб
<variant> имипрамин
<variant> кетамин
<variant> пирацетам
<variant> женьшень тұндырмасы
<question> Психиатрияда жедел және созылмалы психозды емдеу үшін ... қолданылады.
<variant >нейролептиктер
<variant >нормотикалық дәрілер
<variant >галлюциногендер
<variant >транквилизаторлар
<variant >антидепресанттар
<question> Нормотимикалық дәрілер-маникалды депрессивті психоз бен шизоаффективті науқасқа ...әсер етеді.
<variant >антиманикалды
<variant >психоделикалық
<variant >антипсихотикалық
<variant >анксиолитикалық
<variant >ноотропты
<question> Қорқынышты, үрейді, елестеуді, агрессияны, эмоционалды қайғыруды төмендетеді және ОЖЖ белсенді немесе седативті әсер етеді, олар-... .
<variant >транквилизаторлар
<variant >наллюциногендер
<variant >антидепресанттар
<variant >нейролиптиктер
<variant >ноотропты заттар
<question > Миокард инфарктында .... тағайындайды.
<variant> наркотикалық анальгетиктерді
<variant> стероидты емес қабынуға қарсы дәрілерді

<variant> стероидты қабынуға қарсы дәрілерді
<variant> антифибринолитиктерді
<variant> гемостатиктерді
<question > Қатерлі ісіктерінде ауырсынуды басудың I- сатысында (Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша)... қолданылады.
<variant> бейнаркотикалық анальгетиктер
<variant> наркотикалық анальгетиктер- жартылай агонистер
<variant> наркотикалық анальгетиктер - агонистер
<variant> наркотикалық анальгетиктердің антагонисттері
<variant> жергілікті анестетиктер
<question > Қатерлі ісіктерінде ауырсынуды басудың III- сатысында (Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша)... қолданылады.
<variant> наркотикалық анальгетиктер - агонистер
<variant> жалпы анестетиктер
<variant> наркотикалық анальгетиктер- жартылай агонистер
<variant> наркотикалық анальгетиктердің антагонисттері
<variant> жергілікті анестетиктер
<question> Морфинизмнің диагностикасында... қолданылады.
<variant> налоксон
<variant> морфин
<variant> бупренорфин
<variant> кодеин
<variant> лоперамид
<question> Анальгетикалық әсері бар дәрілерге... жатады.
<variant> клонидин
<variant> каптоприл
<variant> амизон
<variant> галоперидол
<variant> бисапролол
<question> Парацетамолға... тән.
<variant> гепатотоксикалық әсер
<variant> бейстероидты қабынуға қарсы заттарға жатуы
<variant> наркотикалық анальгетиктерге жатуы
<variant> жүктілікте қарсы көрсеткіш болуы
<variant> асқазан ішек жолдарын тітіркендіруі
<question> Ацетилсалицил қышқылына...тән.
<variant> антиагреганттық әсерге ие
<variant> жүктілік кезінде қолдануға болатыны
<variant> асқазан-ішек шырышты қабытына тітіркендіргіш әсер бермейтіні
<variant> антикоагулянттық әсерге ие
<variant> педиатрияда қолдануға болатыны
<question> Наркотикалық анальгетиктердің ішінде диареяға қарсы әсері бар препараттарға... жатады.
<variant> лоперамид
<variant> кодеин
<variant> пентазоцин
<variant> просидол
<variant> трамадол
<question> Наркотикалық анальгетиктерді... қолдануға болмайды.
<variant> жедел іштің ауырсынуында
<variant> травматикалық ауырсынуында
<variant> операциядан кейін ауырсынуында
<variant> онкологиялық науқастардың ауырсынуында
<variant> миокард инфарктісінде
<question> Наркотикалық анальгетиктердің әсеріне... жатады.

<variant> миоз, тыныстың тежелуі
<variant> тәбеттің жоғарылауы
<variant> диарея, ішек шаншымасы
<variant> дисфория, депрессия
<variant> артериялық қысымның жоғарылауы
<question> Наркотикалық анальгетиктермен жедел улану кезінде болатын симптомдарына... жатады.
<variant> цианоз, дене температурасының төмендеуі
<variant> мидриаз
<variant> күшті жөтел, дене температурасының жоғарылауы
<variant> диарея
<variant> тахикардия
<question> Ең күшті ауырсынуға қарсы әсер... тән.
<variant> фентанилге
<variant> морфинге
<variant> пентазоцинге
<variant> тримеперидинге
<variant> трамадолға
<question> Айқын ауырсынуға қарсы әсерге... ие.
<variant> кеторолак
<variant> аспирин
<variant> парацетамол
<variant> анальгин
<variant> бутадион
<question>Отадан кейінгі жарақатанудағы ауырсынуға қарсы қолданылатын дәрілер...болып табылады.
<variant> кетопрофен, анальгин
<variant>опиоид, морфин
<variant>бициллин, пенициллин
<variant>кризанол, санакризин
<variant> преднизолон, дексаметазон
<question >Жіті ауырсыну синдромында наркотикалық дәрілер … қолданылады
<variant>отадан кейін
<variant>ем алдында
<variant>ем біткеннен кейін
<variant>естен танғаннан кейін
<variant>жеңіл жарақат кезінде
<question >Белсенділігі жоғары дәрілер- қабынуға қарсы бейстеройдты препарат... болып табылады.
<variant>диклофенак
<variant>морфин
<variant>резепин
<variant>парацетамол
<variant> бупренорфин
<question >Орташа әсерететін наркотикалық анальгетик тобына... жатады.
<variant> промедол
<variant>баралгин
<variant>морфин
<variant>индометацин
<variant>кодеин
<question >Просидол наркотикалық дәріні… тәуліктен артық колданбайды.
<variant> 5
<variant>2
<variant> 3
<variant> 1
<variant>7
<question >Өте күшті әсер ететін наркотикалық анальгетик тобына...жатады.

<variant>морфин
<variant>трамадол
<variant>резерпин
<variant>триамцинолон
<variant>анальгин
<question>0,2 мг тіл астына өте ауыр жарақаттану кезінде шоққа қарсы қолданылатын препарат...болып табылады.
<variant>бупренорфин
<variant>анальгин
<variant>баралгин
<variant>диклофенак
<variant>парацетамол
<question>Күшті әсерлі наркотикалық анальгетиктер тобына ... жатады
<variant>фентанил
<variant>бупренорфин
<variant>трамадол
<variant>кодеин
<variant>налбуфин
<question>Күшті әсерлі наркотикалық анальгетик бупренорфин әсер ету уақыты... .
<variant>6-8 сағ
<variant>9-10 сағ
<variant>4-5 сағ
<variant>1-2 сағ
<variant>3-5 сағ
<question>Созылмалы ауырсыну синдромының 4-ші сатысында қолданылатын наркотикалық анальгетик.. .
<variant>бупренорфин
<variant>трамадол
<variant>кодеин
<variant>налбуфин
<variant>морфин
<question>Дәрілік заттардың гематоэнцефалды тасымалдануының негізгі механизмі-.. .
<variant>пассивті диффузия
<variant>адсорбция
<variant>пиноцитоз
<variant>жеңілдетілген диффузия
<variant>фильтрация
<question>Дәрілік затты энтералды жолмен енгізуге жатады-.. .
<variant>ауыз арқылы
<variant>тіл астына
<variant>бұлшықетке
<variant>ректальды жолмен
<variant>артерияға
<question>Дәрілік заттар бірінші бауыр тосқауылы арқылы өтеді.. .
<variant>пероралды енгізгенде
<variant>сублингвалды енгізгенде
<variant>рекальды енгізгенде
<variant>суббукальды енгізгенде
<variant>ингаляциялық жолмен енгізгенде
<question>Аурудың жағымсыз симптомдарын жою үшін дәрілік заттарды қолдану... аталады.
<variant>симптоматикалық ем
<variant>орынбасушы ем
<variant>потогенетикалық ем
<variant>профилактикалық ем

<variant>этиотропты ем
<question>Дәрілік заттардың жүктіліктің алғашқы 8 аптасына дейінгі органогенез бұзылысына әкелетін әсері … деп аталады.
<variant>эмбриотоксикалық
<variant>фетотоксилалық
<variant>мутагенді
<variant>канцерогенді
<variant>тератогенді
<question>Әсердің ағзада "жинақталуы" ... деп аталады.
<variant> функционалдық кумуляция
<variant> физикалық тәуелділік
<variant> психикалық тәуелділік
<variant> материалдық кумуляция
<variant> тахифилаксия
<question>Дәрілік заттармен сезімтал рецепторлардың ынталануынан кейін пайда болатын әсерді … деп атайды.
<variant> рефлекторлы
<variant> резорбтивті
<variant> жергілікті
<variant> түрлендіруші
<variant> страбоскопиялық
<question > Ревматизмді емдеуге негізгі заттар ... болып табылады.
<variant> қабынуға қарсы дәрілер
<variant> цефалоспориндер
<variant> оксихинолиндер
<variant> макролидтер
<variant> пенициллиндер
<question >Ревматизмде глюкокортикоидтарды ... .
<variant> біртіндеп төмендететін дозада тағайындайды
<variant> біртіндеп жоғарылататын дозада тағайындайды
<variant> қалыпты дозада қабылдайды
<variant> тағайындамайды
<variant> 5 күнге дейін тағайындайды
<question > Ревматизмнің көптеген жағдайларында глюкокортикоидтар тобынан таңдаулы препарат ... болып табылады.
<variant> преднизолон
<variant> дексаметазон
<variant> гидрокортизон
<variant> метилпреднизолон
<variant> триамцинолон
<question > Айқын қан айналым жетіспеушілігімен ревматизммен ауырған науқастың емдеу үшін ең тиімді препарат... болып табылады.
<variant> триамцинолон
<variant> дексаметазон
<variant> гидрокортизон
<variant> метилпреднизолон
<variant> бетаметазон
<question > Ревматизмде бейстероидты қабынуға қарсы дәрілік заттарды ... .
<variant> тұрақты дозада тағайындайды
<variant> мүлдем тағайындамайды
<variant> төмен дозаларда тағайындайды
<variant> жоғары дозаларда тағайындайды
<variant> 10 күннен артық тағайындамайды
<question > Дәрілік құралдарды ... енгізу энтеральды жолына жатады.

<variant> ректальды
<variant> қан тамыры ішіне
<variant> бұлшық ет ішіне
<variant> ингаляциялық
<variant> тері астына
<question > Дәрілік заттарды ... жолмен енгізу энтеральды жолына жатпайды.
<variant> ингаляциялық
<variant> пероральдық
<variant> ректальды
<variant> сублингвальды
<variant> он екі елі ішектің қуысына
<question >Дәрілік заттарға төзімділік деп... атайды.
<variant> дозаның көбейтуін талап ететін, фармакотерапия әсерінің төмендеуін
<variant> дәрілік заттардың фармакологиялық әсерінің күшеюін
<variant> организмде дәрілердің жиналуынан пайда болатын дәрілік құралдардың әсерінің жоғарылауын
<variant> организмнің нақты бір тіндерге айқын троптылығынан дәрілік құралдардың әсерінің жоғарылауын
<variant> дәрілік заттарға организмнің бұрмаланған реакциясын
<question >Дәрілік заттардың дозадан байланыссыз кері әсерлеріне... жатады.
<variant> жедел және баяу типті иммунологиялық реакциялар
<variant> абсолютті және орташа шамадан тыс дозадан туындаған токсикалық асқынулар
<variant> дәрілік препараттардың химиялық құрамымен байланысты реакциялар
<variant> дәрілік препараттардың фармакологиялық қасиеттерімен байланысты реакциялар
<variant> доғару синдромы
<question > Дәрілердің халықаралық патенттентелмеген аты болып... табылады.
<variant> арнайы денсаулық сақтау орындарымен бекітіліп, халықтық және халықаралық фармакопеяға енгізілген аты
<variant> медицина тәжірибесінде кең қолданылатын дәрінің аты
<variant> дәрінің толық химиялық аты
<variant> шығарылған фирманың берілген аты
<variant> дәрінің саудадағы аты
<question > Плацебо – бұл ... .
<variant> бір дәрінің түрін немесе дәмін білдіретін, белсенділігі жоқ индифферентті зат
<variant> белгілі органдарда емдеу, диагностикалау, алдын алу мақсатында қолдануға рұқсат етілген фармакологиялық зат
<variant> терапевтік,профилактикалық немесе диагностикалық әсер етуші дәрілердің компоненттері
<variant> дәрілерді дайындауға керек қосымша заттар
<variant> фармакологиялық белсенділігі анықталған клиникалық зерттелетін зат
<question > Қиыстырылған дәрілер – бұл ... .
<variant> құрамында бірнеше әсер етуші зат бар дәрілік құралдар
<variant> қабылдауға ыңғайлы дәрілік түрлері
<variant> дәрілік өсімдік шикізатынан алынған ішке және сырт тәнге қолдануға арналған түрлі сығындылар
<variant> орауышта екі әр түрлі препарат бар дәрілік құралдар
<variant> дәрілік препараттың әртүрлі дәрілік түрлерінен тұратын дәрілік құралдар
<question >Фармакотерапияда резистенттілік деп ... атайды.
<variant> дәрілік заттардың қайта қолданғанда ағзаның реакциясының төмендеуін
<variant> науқастың дәріге тұрақтылығын
<variant> патогенетикалық фармакотерапияға патологиялық процестің тұрақтылығын
<variant> дәрілерді қалыпты мөлшерде тағайындағанда ағзаның жоғарғы реакциясын
<variant> аз уақыт аралығында қайта тағайындағанда фармакологиялық әсердің тез төмендеуін
<question >Тахифилаксия – бұл ... .
<variant> қысқа уақыт аралығында қайта тағайындағанда фармакологиялық әсердің бірден төмендеуі
<variant> дәріні қайта бергенде ағзаның реак циясының төмендеуі

<variant> патогенетикалық фармакотерапияға патологиялық процестің тұрақтылығы
<variant> дәрілерді қалыпты мөлшерде тағайындағанда ағзаның жоғарғы реакциясы
<variant> аз уақыт аралығында қайта тағайындағанда фармакологиялық әсердің тез төмендеуі
<question > Дәріге тәуелділік деп ... аталады.
<variant> ағзаның дәрілік препараттарды қабылдаудағы патологиялық қажеттілігі
<variant> фармакологиялық әсерінің өзгеруі
<variant> дәрілік препаратты кенеттен тоқтатқанда жалпы жағдайының нашарлауы
<variant> дәрілік препаратқа ағзаның реакциясының жоғарылауы
<variant> дәрілік препаратқа ағзаның төмендетілген реакциясы
<question >Бейстероидты қабынуға қарсы дәрілік заттардың әсер ету механизмі... болып табылады.
<variant> простагландиндердің синтезін катализдейтін фермент циклооксигеназаны ингибирлеу
<variant> арахидон қышқылының босатылуын блоктау
<variant> бауырдың микросомальды ферменттерін индуциялау
<variant> медиаторлардың босатылуын блоктау
<variant> фосфолипаза A_2- ні блоктау
<question >Бейстероидті қабынуға қарсы дәрілердің ішіндегі циклооксигеназа – 2 ферментін таңдамалы тежеушілерге... жатады.
<variant> нимесулид, мелоксикам
<variant> индометацин, ибупрофен
<variant> нимесулид, бутадион
<variant> аспирин, аспизоль
<variant> диклофенак, индометацин
<question > Парацетамолмен жедел уланғанда көбінесе ... ауыр зақымдалады.
<variant> бауыр және бүйрек каналдары
<variant> өкпе және асқазан-ішек трактісі
<variant> бас миы және перифериялық жүйке жүйесі
<variant> ұйқы безі және көкбауыр
<variant> сүйек кемігі
<question > Ацетилсалицил қышқылының... бар
<variant> қабынуғы қарсы әсері
<variant> зәр шығару әсері
<variant> гиполипидемиялық әсері
<variant> гипотензивті әсері
<variant> жөтелге қарсы әсері
<question >Әсері ұзақ қабынуға қарсы дәрілік заттарға... жатады.
<variant> пироксикам (фельден)
<variant> бутадион (фенилбутазон)
<variant> ибупрофен (бруфен)
<variant> индометацин (метиндол)
<variant> диклофенак (ортофен)
<question > Әсер ету ұзақтығы орташа қабынуға қарсы дәрілік заттарға... жатады.
<variant> напроксен (напробене)
<variant> ацетилсалицил қышқылы (аспирин)
<variant> ибупрофен (бруфен)
<variant> индометацин (метиндол)
<variant> анальгин
<question > Әсер ету ұзақтығы қысқа қабынуға қарсы дәрілік заттарға... жатады.
<variant> ацетилсалицил қышқылы (аспирин)
<variant> мелоксикам
<variant> ибупрофен (бруфен)
<variant> нимесулид
<variant> пироксикам
<question > Қабынуға қарсы бейстероидты препараттардың қабынуға қарсы әсері ... басталады
<variant> 20-30 минуттан кейін

<variant> 10-15 минуттан кейін
<variant> 10-12 сағаттан кейін
<variant> 5-10 аптадан кейін
<variant> 10-15 күннен кейін
<question > Ұзаққа созылған және қайталанатын ревматизм кезінде дәрілік терапияға … қосылады.
<variant> хлорохин
<variant> тетрациклиндер
<variant> фурациллин
<variant> парацетамол
<variant> полимиксин М сульфаты
<question > Ұзаққа созылған және қайталанатын ревматизм кезінде хлорохинмен емдеу курсы... болады.
<variant> 1 жыл және одан көп
<variant> 1-2 апта
<variant> 1 ай
<variant> 2 ай
<variant> бірнеше жыл
<question > Қайталанатын ревматизмді алдын-алу үшін... қолданылады.
<variant> бициллин-5
<variant> аспирин
<variant> индометацин
<variant> преднизолон
<variant> дексаметазон
<question > Қайталанатын ревматизмнің алдын-алу үшін... өткізіледі.
<variant> соңғы ревматикалық күшеюден кейін 5 жылдың ішінде
<variant> соңғы ревматикалық күшеюден кейін 10 жылдың ішінде
<variant> соңғы ревматикалық күшеюден кейін 1 аптаның ішінде
<variant> соңғы ревматикалық күшеюден кейін 1 айдың ішінде
<variant> соңғы ревматикалық күшеюден кейін 1 жылдың ішінде
<question > Жүрек зақымдануымен сипатталынатын дәнекер тіндердің жүйелі қабыну аурулары «...» деп аталынады.
<variant> ревматизм
<variant> ревматоидты полиартрит
<variant> жүйелі қызыл жегі
<variant> жүйелі склеродермия
<variant> Бехтерев ауруы
<question > Преднизолонды ішке қолданғанда ұстап тұрушы орташа тәуліктік дозасы... тең болады.
<variant> 5 мг-ға
<variant> 50 мг-ға
<variant> 0,5 г-ға
<variant> 0,1 г-ға
<variant> 0,1 мг-ға
<question > Алтын препараттарының ревматизмге қарсы әсері... дамиды.
<variant> 3-6 айда және одан көп
<variant> 2 жылдың ішінде
<variant> 2 айдың ішінде
<variant> 2 аптадан кейін
<variant> 1 аптадан кейін
<question > Ревматоидты артритті емдеу үшін базистік терапияда... қолданылады.
<variant> алтын препараты
<variant> пироксикам
<variant> индометацин
<variant> напроксен
<variant> диклофенак-натрий

<question> Ревматизмнің себептанулық фармакотерапиясында қолданылатын пенициллин әсер етеді:
<variant > b - гемолиздеуші стрептококқа бактерицидтік әсер етеді
<variant > пневмококқа бактерицидтік әсер етеді
<variant > b - гемолиздеуші пневмококқа бактериостатикалық әсер етеді
<variant > менингококқа бактериостатикалық әсер етеді
<variant > b - гемолиздеуші стрептококқа бактериостатикалық әсер етеді
<question > Ревматизмді емдеудің негізгі дәрілік құралдарына ... жатады.
<variant> қабынуға қарсы дәрілер
<variant> цефалоспориндер
<variant> оксихинолиндер
<variant> макролидтер
<variant> липостатиктер
<question>30 жастағы әйелге, 12 апта жүктілік кезінде ауруханадан тыс пневмония диагнозы қойылған. Бұл жағдайда ... қауіпсіз антибиотик қауіпсіз болып табылады.
<variant>амоксициллин
<variant>гентамицин
<variant>левомицетин
<variant>тетрациклин
<variant>доксициклин
<question> Диклофенак-натрийдің негізгі қолдану көрсеткіштері ... болып табылады.
<variant > ревматим, ревматоидты артрит, миозиттер, невриттер
<variant > вирустық инфекция тудырған қызба
<variant > премедикация, операциядан кейінгі кезен
<variant > аллергиялық реакция
<variant > тромб түзілудің алдын алу үшін жүректің ишемиялық ауруы
<question> Қабынуға қарсы бейстероидты препараттар тобына ... жатады.
<variant>ацетилсалицил қышқылы, бутадион, индометацин
<variant> гидрокартизон, преднизалон, метилпреднизолон
<variant> кризанол, хингамин, метотрексат
<variant> димедрол, супрастин, тавегил
<variant> кортикотропин, окситоцин, гонадотропин
<question > Қабынуға қарсы мембранотұрақтандырғыш әсері бар препараттарға ... жатады.
<variant> интал
<variant> аспирин
<variant> индометацин
<variant> ибупрофен
<variant> пироксикам
<question > Ревматоидты артритті бейстероидты қабынуға қарсы дәрілермен емдеу курсының ұзақтығы ... болады.
<variant> бірнеше айлар
<variant> 1 ай
<variant> 1 апта
<variant> бірреттік қабылдау
<variant> 2 апта
<question > Жүйелі қызыл жегі ауруын емдеуде ең тиімді... болып табылады.
<variant> глюкокортикоидтар
<variant> бейстероидты қабынуға қарсы дәрілер
<variant> цитостатики
<variant> цефалоспориндер
<variant> сульфаниламидтер
<question > Реополиглюкин шокқа қарсы әсерімен бірге ... әсер көрсетеді.
<variant> қабынуға қарсы
<variant> ыстық төмендететін
<variant> иммуноқуаттандырғыш

<variant> иммунодепрессивті
<variant> қан тоқтататын
<question > Фторхинолондарды... бірге бергенде нейротоксикалық әсері жоғарылайды.
<variant> бейстероидты қабынуға қарсы дәрілермен
<variant> метилксантиндермен
<variant> А және С витаминдермен
<variant> В1 және В6 витаминдермен
<variant> пенициллиндермен
<question > Глюкокортикоидтардың қабынуға қарсы әсері ... байланысты.
<variant> липокортин синтезін реттеу арқылы фосфолипазы А2-ні ингибирлеумен
<variant> рецепторларды блоктау арқылы фосфолипазы А2-ні ингибирлеумен
<variant> циклооксигеназа А1 ингибирлеумен
<variant> циклооксигеназа А2 ингибирлеумен
<variant> липооксигеназаны ингибирлеумен
<question > Ацетилсалицил қышқылын тағайындауға... қарсы көрсеткіш болады.
<variant> геморрагиялық инсульт
<variant> миалгия, артралгия
<variant> лихорадка
<variant> ревматоидты артрит
<variant> миокард инфарктісінің алдын-алу
<question > Ацетилсалицил қышқылының гепаринмен әсерлесуінде ... байқалады.
<variant> антикоагулянттық әсердің күшеюі
<variant> антикоагулянттық әсердің бәсеңдеуі
<variant> гипогликемиялық әсердің күшеюі
<variant> гипотензивтік әсердің күшеюі
<variant> ыстықты басатын әсердің күшеюі
<question > Ауыр гематологиялық асқынулар (нейтропения, агранулоцитоз, апластикалық анемия)... тән.
<variant> фенилбутазонға (бутадион)
<variant> ибупрофенге (бруфен)
<variant> сулиндакқа (клинорил)
<variant> кеторолакқа (кетанов)
<variant> набуметонға (релафен)
<question > Радикулонейропатияны емдеу үшін... қолданылады.
<variant> бейстероидты қабынуға қарсы дәрілер, В тобындағы витаминдер
<variant> глюкокортикоидтар
<variant> цитостатиктер
<variant> С и Е витаминдері
<variant> седативті дәрілер және транквилизаторлар
<question > Бейстероиды қабынуға қарсы препараттарды қолданған кезінде ағзаның гиперсезімталдығының (есекжем, Квинке ісінуі, аспириндік астма) жоғарылауы... байланысты.
<variant> лейкотриендердің бөлінуіне
<variant> аралық метаболиттердің бөлінуіне
<variant> простагландиндердің бөлінуіне
<variant> белсенді емес метаболиттердің бөлінуіне
<variant> циклооксигеназаның тежелуіне
<question > Бейстероидты қабынуға қарсы препараттар гипотензивті дәрілермен бірге қолданғанда соңғы препараттардың әсері... .
<variant> төмендейді
<variant> күшейеді
<variant> өзгермейді
<variant> бұзылады
<variant> бірінші препараттың жанама әсерін күшейтеді

<question > Егер... болса, бейстероидты қабынуға қарсы препараттарды қолданған кезде асқазан шырышты қабығына зақымдануы төмендейді.
<variant> асқазан шырышты қабығына қорғаныс әсер ететін препараттарды қолданатын (мизопростол, омепразол)
<variant> препараттардың енгізуі өзгеретін (дозаның төмендеуі, парентеральды, ректальды және жергілікті енгізу)
<variant> селективті циклооксигеназа -2 ингибиторларды қолданатын
<variant> продәріні қолданатын (сулиндак)
<variant> екі қабынуға қарсы препараттарды бір уақытта қолданатын
<question >Пенициллинді топтағы антибиотиктердің... қайшылық аллергиялық реакциялары болады.
<variant> цефалоспориндермен
<variant> аминогликозидтермен
<variant> нитрофурандармен
<variant> полипептидтермен
<variant> тетрациклиндермен
<question > Құрамында фенотиазин тобы бар антигистаминдік препарат, оның қарсы көрсеткіші аллергиялық серпілістерге ... жатады.
<variant> прометазин (пипольфен)
<variant> клемастин (тавегил)
<variant> цетиризин (зиртек)
<variant> эбастин (кестин)
<variant> акривастин (семпрекс)
<question > Антиаллергиялық эффектісі бар 1-ші туынды антигистаминдік дәрілердің көбісінің әсер ету ұзақтығы... .
<variant> шамамен 4 – 12 сағатқа тең
<variant> шамамен 2 – 3 сағатқа тең
<variant> шамамен 12 – 48 сағатқа тең
<variant> шамамен 36 - 48 сағатқа тең
<variant> 10 тәуліктен көп
<question > 2-ші туынды антигистаминдік дәрілердің әсер ету ұзақтығы... тең.
<variant> 12 – 48 сағатқа
<variant> 4 – 12 сағатқа
<variant> 2 – 3 сағатқа
<variant> 36 - 48 сағатқа
<variant> 10 тәулікке
<question > 1-ші туынды антигистаминдік дәрілердің фармакологиялық эффектісіне... жатпайды.
<variant> жергілікті тітіркендіру әсері
<variant> антихолинергиялық әсер
<variant> аллергияға қарсы әсер
<variant> седативті әсер
<variant> жергілікті анестезирлеуші әсер
<question > Клемастин... жатады.
<variant> 1-ші буындағы Н1-гистаминоблокаторларға
<variant> глюкокортикоидтарға
<variant> мес жасушалардан гистамин бөлінуін тежейтін препараттарға
<variant> цитостатиктерге
<variant> 2-ші буындағы Н1-гистаминоблокаторларға
<question > Дексаметазон ... жатады.
<variant> ұзақ әсерлі глюкокортикоидтарға
<variant> Н1-гистаминоблокатордың 1 буынына
<variant> мес жасушаларынан шығатын гистаминді тежеуші препараттарға
<variant> цитостатиктерге
<variant> Н1-гистаминоблокаторлардың 2 буынына
<question > Маусымдық аллергиялық ринитті шақыратын аллергендерге ... жатады.

<variant> өсімдік тозаңдары
<variant> үй тозаңдары
<variant> сигареттік түтін
<variant> үй жануарларының жүні
<variant> парфюмерия
<question > Анафилактикалық шоктың фармакотерапиясында... қолданылады.
<variant> адреналин
<variant> каптоприл
<variant> биспролол
<variant> сальбутамол
<variant> вальсартан
<question > Квинке ісінуі мен есекжемді емдеу үшін... қолданылады.
<variant> глюкокортикоидтар
<variant> Н2-гистаминоблокаторлар
<variant> антибиотиктер
<variant> адреноблокаторлар
<variant> холиноблокаторлар
<question > Жүйелі қызыл жегі емінде... тиімді .
<variant> глюкокортикоидтар
<variant> антибиотиктер
<variant> Н1-гистаминоблокаторлар
<variant> антигантигистаминді препараттар
<variant> анестетиктер
<question > Терфенадин және астемизолды... бірге қолдануға болмайды.
<variant> кетоконазолмен
<variant> ампициллинмен
<variant> прометазинмен
<variant> бромгексинмен
<variant> атропинмен
<question > 2-ші буындағы Н1-гистаминоблокаторларды... бірге қолдануға болмайды.
<variant> эритромицинмен
<variant> сальбутамолмен
<variant> нитроглицеринмен
<variant> эналаприлмен
<variant> сульфацетамидпен
<question > Н1- гистаминоблокаторлардың ішінде орталық жүйке жүйесіне ең аз дәрежеде тежегіш әсер... көрсетеді.
<variant> лоратадин
<variant> прометазин
<variant> тавегил
<variant> хлоропирамин
<variant> дифенгидрамин
<question > Н1-гистаминобокаторлардың ішінде құсыққа қарсы әсер... тән.
<variant> прометазинге
<variant> лоратадинге
<variant> астемизолға
<variant> терфенадинге
<variant> диазолинге
<question > 1-ші буындағы Н1-гистаминоблокаторлар 2-ші буындағы Н1-гистаминоблокаторларға қарағанда... .
<variant> анафилактикалық шокта тиімді болады
<variant> жанама әсерлері аз болады
<variant> риноконьюнктивитте өте тиімді болады
<variant> 24 сағат және одан көп әсер етеді

<variant> құсыққа қарсы әсері жоқ
<question> Пациент А. нитроглицерин мен силденафилді қатар қабылдаған. Мүмкін болатын дәрілік өзара әрекеттесуі... .
<variant> қан қысымының күрт төмендеуі
<variant> жүрек соғуының жиілеуі
<variant> асқазан безі секрециясының артуы
<variant> несептің тежелуі
<variant> гипергликемия
<question> Пациент В. парацетамол мен алкогольді қатар қабылдаған. Дәрілер арасындағы өзара әсер сипатын таңдаңыз.
<variant> Гепатоуыттылықтың жоғарылауы
<variant> Асқазан сөлінің тежелуі
<variant> Қан қысымының төмендеуі
<variant> Депрессияның күшеюі
<variant> Бүйрек қызметінің жақсаруы
<question> Пациент С. варфарин мен аспирин қабылдауда. Дәрілердің өзара әрекеттесу салдары.. .
<variant> қан кету қаупінің артуы
<variant> асқазан перистальтикасының төмендеуі
<variant> жүрек соғысының баяулауы
<variant> бронхоспазм
<variant> екі дәрінің әсері төмендейді
<question> Пациент Д. фуросемид пен аминогликозид антибиотиктерін қолданады. Өзара әсердің ықтимал нәтижесі.. ..
<variant> отоуыттылық пен нефроуыттылықтың жоғарылауы
<variant> гипотензияның төмендеуі
<variant> фуросемидтің әсері тежеледі
<variant> иммунитеттің жоғарылауы
<variant> артериялық қан қысымы артады
<question> Пациент А. теофиллин мен ципрофлоксацин қабылдайды. Мүмкін болатын фармакокинетикалық өзара әсері.. .
<variant> теофиллиннің концентрациясы артады
<variant> теофилиннің әсері азаяды
<variant> тыныс алу тежеледі
<variant> қан қысымы жоғарылайды
<variant> эпилепсия дамиды
<question> Пациент А. амитриптилин мен алкогольді бірге қабылдаған. Олардың өзара әсер ету сипаты... .
<variant> ОЖЖ-ің тежелуі күшейеді
<variant> серотонин деңгейі төмендейді
<variant> асқазан безі секрециясының күшеюі
<variant> тыныс алу жақсарады
<variant> ұйқысыздық пайда болады
<question> Пациент А. эритромицин мен теофиллин қабылдаған. Өзара әрекеттесу механизмі... .
<variant> эритромицин CYP450 ферментін тежейді
<variant> эритромицин теофиллинді ыдыратады
<variant> теофиллин әсерін әлсіретеді
<variant> фермент индукциясын арттырады
<variant> асқазан сөлін бейтараптайды
<question > Гонорея мен мерезді емдеу үшін жүктілік кезінде пенициллиндерге аллергия болған жағдайда... негізгі препарат болып табылады.
<variant> эритромицин
<variant> ципрофлоксацин
<variant> бисептол
<variant> доксициклин

<variant> бензатинбензилпенициллин
<question > Аллергиялық реакциялар пайда болуына байланысты ең қауіпті қиыстыру... болуы мүмкін.
<variant> пенициллин мен цефалоспориндерде
<variant> пенициллин мен тетрациклиндерде
<variant> пенициллин мен макролидтерде
<variant> пенициллин мен нитрофурандарда
<variant> пенициллин мен сульфаниламидтерде
<question>Қабынуға қарсы стероидты препараттардың қолдану көрсеткіштері ... болып табылады.
<variant > аутоиммундық қабыну, аллергиялық қабыну, коллагеноздар
<variant > микробты қабыну, артрит
<variant > миозит, неврит, артрит
<variant > остеопороз, аллергия
<variant > премедикация, остеопороз
<question> Физикалық тәуелділіктің қалыптасуы ... шамадан тыс қолданғанда байқалады.
<variant> героин
<variant> реланиум
<variant> кокаин
<variant> алкоголь
<variant> трамадол
<question> Орташа дәрежелі алкогольдік масаю кезінде қандағы алкоголь концентрациясы-... .
<variant> 0,5–0,9 промилле
<variant> 0,02–0,09 промилле
<variant>0,1-0,4 промилле
<variant> 1,0–1,9 промилле
<variant> 2,0–3,9 промилле
<question> Аз мөлшердегі алкогольдің әсері... .
<variant> анксиолитикалық
<variant> антипсихотикалық
<variant> антидепрессивтік
<variant> антиманиакалық
<variant> құрысуға қарсы
<question> Героинмен улану (артық дозалану) кезінде қолданылатын...болып табылады.
<variant> налоксон
<variant> этанол
<variant> реланиум
<variant> атропин
<variant> метадон
<question>Емделушіге дәрігер изониазид тағайындады, себебі қазіргі уақытта отбасы мүшелерінің бірі туберкулезбен ауырады. Осыдан кейін науқаста жүргізілген емге қарамастан изониазидтік емге резистентті туберкулез дамыды. Резистенттіліктің даму механизмі қандай?
<variant>Каталазаны кодтайтын ген экспрессиясының төмендеуі
<variant>Препараттың жасушаішілік жинақталуының төмендеуі
<variant>N-ацетилтрансфераза арқылы препаратты инактивациялау
<variant>Миколий қышқылдарының синтезін арттыру
<variant>ДНК-тәуелді РНК-полимеразаны кодтайтын гендегі мутациялар
<question>7 жасар бала фарингит қызбасымен 2 күн бойы ауырды. Микробиологиялық талдау кезінде үлкен емес, мөлдір, бета-гемолитикалық колониялар, in vitro бацитрацинге сезімталдықты анықтады. Бұрын балада құлақ инфекциясын емдеуде амоксициллинге ауыр аллергиялық реакция байқалды. Дәрігер антибиотикотерапия тағайындайды, бірақ парентеральды енгізуді талап ететін дәрі қолданбауды жөн көреді. Келесі препараттардың қайсысы ең тиімді және қауіпсіз болады?
<variant>Азитромицин
<variant>Цефаклор
<variant>Доксициклин
<variant>Пенициллин

<variant>Ванкомицин
<question>Әйелде жыныстық жолмен берілетін ауру анықталды. Амбулаториялық режимде антибиотикотерапия тағайындау туралы шешім қабылданды. Оны емдеу кезінде алкоголь қабылдайтын болса, жағымсыз жанама реакциялар орын алуы мүмкін деп ескертті. Бұл антибиотик:
<variant>Метронидазол
<variant>Цефтриаксон
<variant>Доксициклин
<variant>Офлоксацин
<variant>Пенициллин
<question>Емханаға 15 жастағы жасөспірім тәбеттің бұзылуына, жүрек айнуы мен құсу ұстамаларына, іште ауырсыну сезіміне шағымданды. Терапевт аскаридоз диагнозын қойды. Дөңгелек құрттар туындатқан аурулардың көпшілігінде қандай препарат ең тиімді?
<variant>Мебендазол
<variant>Хлорохин
<variant>Метронидазол
<variant>Празиквантел
<variant>Пириметамин
<question>Бактериялық пневмониясы бар пациентке 50s рибосомалық суббірлігінде әсер ететін антибиотик тағайындалды. Бұл препарат:
<variant>Азитромицин
<variant>Цефтриаксон
<variant>Доксициклин
<variant>Офлоксацин
<variant>Клиндамицин
<question>Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа тапшылығы бар емделушіде несеп шығару жолдарының инфекциясын емдеген кезде келесі антибиотик тағайындау ұсынылмайды:
<variant>Сульфаметоксазол
<variant>Ципрофлоксацин
<variant>Амоксициллин
<variant>Цефалексин
<variant>Доксициклин
<question>19 жастағы Пациент маңдай-самай аймағындағы бас ауруына, ретроорбиталды ауырсынуға, сүйектің ауыруына шағымданып жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізілді. Тұмау диагнозы қойылып, "Тамифлю"осельтамивирі тағайындалды. Оның вирусқа қарсы әсер ету механизмі... тежеу:
<variant>Нейраминидазаны
<variant>РНК-полимеразаны
<variant>Кері транскриптазаны
<variant>Тимидинкиназаны
<variant>Аспартатпротеазаны
<question>"АИТВ / ЖИТС" диагнозы бар пациентке антиретровирустық терапия кешені тағайындалды. Біраз уақыттан кейін биохимиялық қан анализінде амилаза мен липазаны қоса алғанда, ұйқы безі ферменттері деңгейінің жоғарылауы анықталды. Бұл симптомдарды қандай препарат тудырды?
<variant>Диданозин
<variant>Эритромицин
<variant>Изониазид
<variant>Зидовудин
<variant>Пиразинамид
<question>Пациент шаңға аллергиялық ринитпен зардап шегеді және дәрігер жиі седативті әсер тудыратын препаратты тағайындауды жоспарлап отыр. Қандай препаратты тағайындау оңтайлы болады?
<variant>Лоратадин
<variant>Бетаметазон
<variant>Циметидин
<variant>Гидроксизин

<variant>Метоклопрамид
<question>Демікпемен ауыратын балаға лейкотриеналық рецепторлардың антагонист-препараты тағайындалды. Қандай препаратты тағайындау оңтайлы болып табылады?
<variant>Зилеутон
<variant>Кромолин
<variant>Монтелукаст
<variant>Ипратропиум
<variant>Теофиллин
<question> Фармакологиялық кумуляция - ... .
<variant> дәрінің әсері қайталап енгізгенде жиналып күшеюі
<variant> дәрінің ағзада физикалық жиналуы
<variant> дәрінің сіңуінің төмендеуі
<variant> ағзадан тез шығуы
<variant> тек бүйректе жиналуы
<question> Материалдық (физикалық) кумуляция ...
<variant> заттың ағзада жиналып қалуы
<variant> заттың әсерінің төмендеуі
<variant> толеранттылықтың дамуы
<variant> иммундық реакция
<variant> ОЖЖ белсенділігінің артуы
<question> Психотроптық және наркотикалық заттарда жиі дамитын құбылыс... .
<variant> тәуелділік
<variant> кумуляция
<variant> сенсибилизация
<variant> идиосинкразия
<variant> антагонизм
<question> Қайталап енгізгенде ағзаның сезімталдығы артып, аллергиялық реакция туындауы —
<variant> сенсибилизация
<variant> кумуляция
<variant> толеранттылық
<variant> антагонизм
<variant> синергизм
<question >Ципрофлоксацин ... туындыларына жатады.
<variant> хинолонның 3 буыны
<variant> 8-оксихинолин
<variant> нитрофуран
<variant> хиноксалин
<variant> хинолонның 1 буыны
<question >Пипемидин қышқылы ... туындыларына жатады.
<variant> хинолонның 2 буыны
<variant> хинолонның 1 буыны
<variant> 8-оксихинолин
<variant> нитрофуран
<variant> хиноксалин
<question > Пиелонефритті емдеуде ... тиімді.
<variant> фторхинолондар
<variant> аминогликозидтер
<variant> пенициллиндер
<variant> полимиксиндер
<variant> тетрациклиндер
<question> Дәрілік тәуелділік дамығанда байқалатын белгі...болып табылады.
<variant> дәріні тоқтатқанда абстиненция
<variant> кумуляция
<variant> толерантность

<variant> антагонизм
<variant> синергизм
<question >Асқынбаған циститте емдеуде ... тиімді.
<variant> амоксициллин
<variant> бензилпенициллин
<variant> метронидазол
<variant> тетрациклин
<variant> фуразолидон
<question >Жүктілікте циститті емдеу үшін ... қолданылады.
<variant> ампициллин
<variant> метронидазол
<variant> тетрациклин
<variant> аминогликозидтер
<variant> ко-тримоксазол
<question > Жедел простатитте емдеу үшін таңдамалы препараттар ... болып табылады.
<variant> фторхинолондар
<variant> ампициллин
<variant> тетрациклин
<variant> сульфаниламидтер
<variant> метронидазол
<question > Ко- тримоксазолмен жедел простатитті емдеу курсы және мөлшерлеуі ... болу керек.
<variant> ішке 160/800 мг- нан күніне 2 рет 14 күн бойы
<variant> ішке 80/400 мг- нан күніне 2 рет 7 күн бойы
<variant> ішке 40/200 мг- нан күніне 2 рет 1 ай бойы
<variant> бұлшық етке 20/40 мг- нан 7 күн бойы
<variant> ішке 80/400 мг- нан бір рет
<question > Науқасқа антибактериалды препаратты жиі тағайындағанда ... пайда болады.
<variant> микробтардың тұрақты түрлері
<variant> қабылдау жиілігінің артуы
<variant> эффективтілігінің жоғарылауы
<variant> емдеу курсының ұзақтығын қысқарту
<variant> иммунитеттің жоғарылауы
<question > Остеомиелитті антибактериалды дәрілермен емдеу курсы... болу керек.
<variant> 6 аптадан кем емес
<variant> 1 рет енгізу
<variant> 1 апта
<variant> үзіліссіз 2 жыл
<variant> 2 апта
<question >Этиологиясы анықталмаған сепсисті емдеуде таңдамалы препарат болып ... табылады.
<variant> пенициллиндер+2-3 буын аминогликозидтері
<variant> рифампицин
<variant> линкозамидтер
<variant> 1 буынның цефалоспориндері
<variant> пенициллиндер+метронидазол
<question >Жүкті әйелдердегі туберкулезді емдеу үшін ... тиімді.
<variant> изониазид
<variant> пиразинамид
<variant> хлорамфеникол
<variant> пенициллин
<variant> тетрациклин
<question >Туберкулезге қарсы дәрілердің негізгі тағайындалу курсы жалпы емдеу қалыптарының ұстанымдарына сәйкес ... тең.
<variant> 6 айға
<variant> 12 айға

<variant> 2 айға
<variant> 24 айға
<variant> 18 айға
<question >Туберкулез микобактериясының тұрақтылығы ... тез дамиды.
<variant> рифампицинге
<variant> параамин салицил қышқылы
<variant> стрептомицинге
<variant> изониазидке
<variant> пиразинамидке
<question >Туберкулезді емдеу үшін қолданатын 2 қатардағы препаратқа ... жатады.
<variant> протионамид
<variant> фтивазид
<variant> рифампицин
<variant> этамбутол
<variant> изониазид
<question >Псевдомонадамен шақырылған инфекцияларда .... тиімді.
<variant> азлоциллин
<variant> стрептомицин
<variant> оксациллин
<variant> цефазолин
<variant> канамицин
<question > Pseudomonas aeruginosa-мен шақырылған инфекцияларда ... тиімді.
<variant> гентамицин
<variant> стрептомицин
<variant> цефазолин
<variant> доксициклин
<variant> хлорамфеникол
<question > Жедел иммунотапшылық синдромын емдеуге ... жатады.
<variant> зидовудин
<variant> оксолин
<variant> ацикловир
<variant> ремантадин
<variant> теброфен
<question >Ревматоидтық артритта метотрексаттың фармакологиялық әсері ... дамиды.
<variant> емнің 1-2 айынан соң
<variant> енгізуден 20-30 минуттан соң
<variant> енгізуден 2-3 сағат бұрын
<variant> 1 апта қабылдағаннан соң
<variant> емнің 6-айында
<question >Табиғи глюкокортикоидтарға .... жатады.
<variant> гидрокортизон
<variant> дексаметазон
<variant> триамцинолон
<variant> флютиказон
<variant> бетаметазон
<question > Бактерицидтік антибиотиктерге ... жатады.
<variant> ампициллин, гентамицин
<variant> олеандомицин, линкомицин
<variant> эритромицин, пенициллин
<variant> ампициллин, тетрациклин
<variant> клиндомицин, доксициклин
<question >Қан-ми тосқауыл арқылы ... өтпейді.
<variant> пенициллин
<variant> цефтриаксон (роцефин, лонгацеф)

<variant> левомицетин
<variant> рифампицин
<variant> цефазолин (цефамезин, кефзол)
<question > Өте ұзақ антибактериальды эффектісі бар цефалоспориндердің III туындыларына... жатады.
<variant> цефтриаксон (роцефин)
<variant> цефотаксим (клафоран)
<variant> цефтазидим (фортум)
<variant> цефтизоксим (эпоцеллин)
<variant> цефоперазон (цефобид)
<question > Бета – лактамазаға тұрақты пенициллиндердің жоғары эффективтілігі препараттың құрамындағы компоненттің ... байланысты.
<variant> патогенді микроорганизмнің өндіріп шығаратын бета лактамазаны байланыстыруына немесе тежеуіне
<variant> қандағы антибиотиктердің концентрациясының жоғарылауына
<variant> микроорганизмнің жасуша мембранасының құрылымын бұзылуына
<variant> микроб жасушасының бөлінуінің тежелуіне
<variant> дәрілердің сіңірілуін жақсартуына
<question > Сульфаниламидтік препараттар ... балаларға қарсы көрсеткіш болып табылады.
<variant> 2-жасқа дейін
<variant> 5-жасқа дейін
<variant> 2 айға дейін
<variant> 8-11 жас
<variant> 6 айға дейін
<question > Тетрациклин тобындағы антибиотиктердің балаларға қарсы көрсеткіші ... дейін.
<variant> 8 – 11жас
<variant> 12 жас
<variant> 16 жас
<variant> 13 жас
<variant> 15 жас
<question > Бактериостатикалық әсері бар антибиотиктерге ... жатады.
<variant> тетрациклиндер
<variant> пенициллиндер
<variant> карбапенемдер
<variant> фторхинолондер
<variant> цефалоспориндер
<question > Тек қана жергілікті қолданылытын саңырауқұлақтарға қарсы препараттарға... жатады.
<variant> тербинафин
<variant> гризеофульвин
<variant> амфотерицин В
<variant> флуконазол
<variant> кетоконазол
<question > Жүйелік қолданылатын саңырыукұлақтарға қарсы препараттарға... жатады.
<variant> миконазол
<variant> интраконазол
<variant> эконазол
<variant> бифоназол
<variant> клотримазол
<question >Полиендік саңырауқұлаққа қарсы препараттардың әсер ету механизмі ... байланысты.
<variant> эргостерол мен саңырауқұлақтың мембранасының және бүтіндігінің бұзылуымен
<variant> ақуыз синтезінің бұзылуымен
<variant> саңырауқұлақтың жасушасында параамин салицил қышқылының синтезінің бұзылуымен
<variant> жасуша қабырғасының синтезінің бұзылуымен
<variant> рибосома деңгейінде ақуыз синтезінің бұзылуымен

<question >Амфотерицин В-ны к/т енгізгенде пайда болатын реакцияларды (қызба, қалтырау, жүрек айну, құсу, бас ауруы, гипотензия) басу үшін ... ұсынылады
<variant> тәтті қолданбау
<variant> бейстероидты қабынуға қарсы немесе антигистаминді дәрілік заттармен премедикациясы
<variant> фентанил – дроперидол премедикациясы
<variant> сүтті тағамдарды қолданбау
<variant> аминазин премедикациясы
<question > Вирусқа қарсы препараттарға ... жатады.
<variant> амизон
<variant> амоксициллин
<variant> хлорамфеникол
<variant> цитеризин
<variant> тетрациклин
<question > Герпестерге қарсы препараттардың әсер ету механизмі... байланысты.
<variant> герпес вирусының көбеюдегі ДНК синтезін блоктау, бірақ латентті жағдайдағы вирустарға әсер етпеуге
<variant> герпес вирусының көбеюдегі ДНК синтезін блоктау, бірақ латентті жағдайдағы вирустарды блоктауға
<variant> тек қана летентті жағдайдағы вирустардың ДНК синтезін блоктауға
<variant> вирустардың РНК синтезін блоктауға
<variant> вирустық капсидтің синтезін бұзуға
<question >Педиатриялық тәжірибеде қолдануға болатын ұшыққа қарсы препараттарға .... жатады.
<variant> фамцикловир
<variant> валацикловир
<variant> ацикловир
<variant> идоксуридин
<variant> фоскарнет
<question > Ганцикловир ... белсенді.
<variant> цитомегаловирусқа қарсы
<variant> А тұмау вирусына
<variant> ұшық вирусына
<variant> В тұмау вирусына
<variant> А және В тұмау вирусына
<question >Альфа-интерферонның ерте байқалынатын жанама әсерлері... пайда болады.
<variant> емделудің 1-ші аптасында
<variant> 2-6 аптасында
<variant> қабылдағаннан соң 5-6 аптадан кейін
<variant> емнің бірінші күніне бастап
<variant> емнің бірінші жылдың ішінде
<question > Альфа-интерферонның кеш байқалынатын жанама әсерлері... пайда болады.
<variant> 2-6 аптасында
<variant> емделудің 1-ші аптасында
<variant> қабылдағаннан соң 5-6 аптадан кейін
<variant> емнің бірінші күніне бастап
<variant> емнің бірінші жылдың ішінде
<question>Аллергиялық ринитпен ауыратын науқасқа эфедринді мұрын тамшысы ретінде тағайындады. Мұрынға тамызу науқастың жағдайын едәуір нашарлатты, бұған түрткі дәріні әрбір 2 сағат сайын қолдану болды, бірақ әсер болған жоқ. Эфедрин тиімсіздігі негізінде не жатыр?
<variant>Тахифилаксия
<variant>Дәрілік тәуелділік
<variant>Кумуляция
<variant>Аллергия
<variant>Идиосинкразия

<question>Дәріханада дәрілік заттарды босату кезінде провизор науқастың назарын цианокобаламин мен тиамин хлоридін бір мезгілде пайдаланудың орынсыздығына аударды. Бұл дәрілердің өзара әсерлесу түрі қалай аталады?
<variant>Фармацевтикалық
<variant>Синергиялық
<variant>Фармакокинетикалық
<variant>Фармакодинамикалық
<variant>Антагонистік
< question> Алкоголь мен диуретиктерді бірге қабылдаудың ықтимал салдары... .
<variant > сусыздануның дамуы
< variant > қысымның жоғарылауы
< variant> диурезді азайту
< variant> бүйрек функциясын жақсарту
<variant > диуретикалық әсердің жоғалуы
<question >Шығындармен нәтиже анализі ... бағалайды.
<variant> тек қана ем бағасын
<variant> тек қана ем нәтижесін
<variant> емнің нәтижесін және бағасын
<variant> ем әсерін
<variant> дәрілік заттардың жанама әсерін
<question > Фармакоэпидемиологиялық зерттеулерге ..... жатпайды.
<variant> жағдайды сипаттау
<variant> жағдайларды зерттеу
<variant> когорттық зерттеу
<variant> рандомизирленген клиникалық зерттеу
<variant> әдісті сипаттау
<question > Фармакоэкономика... зерттейді.
<variant> дәрілік заттардың клиникалық және экономикалық тиімділігін
<variant> мемлекеттің экономикасын
<variant> шет ел экономикасынын
<variant> арзан дәрілерді тағайындаудың пайдасын
<variant> қымбат дәрілерді тағайындаудың пайдасын
<question > Көк іріңді таяқшаға қарсы белсенді антибиотиктерге... жатады.
<variant> цефтазидим, азлоциллин, гентамицин
<variant> ампициллин, оксациллин, тетрациклин
<variant> эритромицин, флуклоксациллин
<variant> пентамицин, тетрациклин, эритромицин
<variant> линкомицин, пенициллин
<question > Бактерицидтік антибиотиктерге ... жатады.
<variant> ампициллин және цефазолин
<variant> олеандомицин және эритромицин
<variant> эритромицин және тетрациклин
<variant> ампициллин және тетрациклин
<variant> клиндамицин және рифампицин
<question > Метициллинге тұрақты стафилококкты инфекцияны емдеуге арналған дәрілік препаратқа... жатады.
<variant> ванкомицин (эдицин)
<variant> метронидазол (трихопол, флагил)
<variant> цефипим (максипим)
<variant> ампициллин / сульбактам (уназин)
<variant> гентамицин
<question > Бетта-лактамаз ингибиторына жататын зат... болып табылады.
<variant> клавулон қышқылы
<variant> ацетилсалицил қышқылы

<variant> янтар қышқылы
<variant> щавел қышқылы
<variant> уксус қышқылы
<question > Ішек таяқшасына белсенді препаратқа ... жатады.
<variant> амикацин
<variant> ванкомицин (ванкоцин)
<variant> тетрациклин
<variant> эритромицин
<variant> амоксициллин
<question > Көп мөлшері бауырмен шығарылатын антибиотиктерге ... жатады.
<variant> макролидтер
<variant> пенициллиндер
<variant> цефалоспориндер
<variant> карбапенемдер
<variant> монобактамдар
<question > ... топтарындағы антибактериалды дәрілерді бірге бергенде синергизм пайда болады.
<variant> Пенициллиндер және аминогликозидтер
<variant> Пенициллиндер және сульфаниламидтер
<variant> Метилксантиндер және тетрациклиндер
<variant> Макролидтер және азолдар
<variant> Алиламиндер және полиендер
<question> Иммунореабилитация деп — ... аталады.
<variant> ағзаның иммундық жүйесінің функционалдық белсенділігін қалпына келтіру үшін медикаментозды және медикаментозсыз әдістерді қолдану
<variant> ағзаның иммундық белсенділігін арттыру үшін дәрілік заттарды тағайындау
<variant> ағзаның иммундық белсенділігін арттырудың медикаментозсыз әдістерін қолдану
<variant> иммуносупрессивті дәрілік заттарды тағайындау
<variant> иммуномодуляторлық дәрілік терапияны қолдану
<question> Иммуномодуляторлар этиотропты химиотерапия кезінде ... тағайындалады.
<variant> этиотропты химиотерапиялық дәрілерді тағайындаған алғашқы күннен бастап
<variant> химиотерапиялық дәрілерді қолдануды бастағаннан кейін 1 ай өткен соң
<variant> химиотерапиялық дәрілерді қолдануды бастардан бір апта бұрын
<variant> толық сауығып болғаннан кейін
<variant> химиотерапия курсы аяқталғаннан кейін жарты жылдан соң
<question > Иммуномодуляторларды қолданған кезде... керек.
<variant> иммунологиялық мониторингті өткізу
<variant> жалпы несептің зерттеуін өткізу
<variant> жалпы қанның зерттеуін өткізу
<variant> науқастың жалпы жағдайын тексеру
<variant> аллергияның маркерлерге зерттеуін өткізу
<question > Иммуномодуляторлық емі тиімді емес немесе әлсіз... болуы мүмкін.
<variant> біріншілік иммунножетіспеушілігінде
<variant> екіншілік иммунножетіспеушілігінде
<variant> аллергиялық реакцияларда
<variant> аутоиммундық ауруларда иммунның жетіспеушілігінде
<variant> жұқпалы синдромдарда
<question > Иммунодепрессанттарға... жатады.
<variant> азатиоприн
<variant> азитромицин
<variant> эритромицин
<variant> пенициллин
<variant> линкомицин
<question > Азатиоприн... трансплантациясында қолданылады.
<variant> бүйрек

<variant> жүрек
<variant> бауыр
<variant> терінің көп бөлігінің
<variant> өкпе
<question>Әйелде жыныстық жолмен берілетін ауру анықталды. Амбулаториялық режимде антибиотикотерапия тағайындау туралы шешім қабылданды. Оны емдеу кезінде алкоголь қабылдайтын болса, жағымсыз жанама реакциялар орын алуы мүмкін деп ескертті. Бұл антибиотик... .
<variant>Метронидазол
<variant>Цефтриаксон
<variant>Доксициклин
<variant>Офлоксацин
<variant>Пенициллин
<question > Маусымдық ринитпен бірге бауыр патологиясы бар науқастрда... қолданылады.
<variant> лоратадин (кларитин)
<variant> астемизол (гисталонг)
<variant> терфенадин (трексил)
<variant> эбастин (кестин)
<variant> дифенгидрамин (димедрол)
<question > 2- ші буындағы антигистаминді препараттар... кезінде қолданылмайды.
<variant> қызғылт теміреткі
<variant> жылдық аллергиялық ринит
<variant> атопиялық дерматит
<variant> балалардың ерте атопиялық синдромы
<variant> поллиноз
<question > Цетиризин (зиртек)... дейінгі балаларда қолданылмайды.
<variant> 1-жасқа
<variant> 6- жасқа
<variant> 3- жасқа
<variant> 12-жасқа
<variant> 6-айға
<question > Жедел бактериалды минингиттің эмпириялық терапияда... қолданылады.
<variant> цефтриаксон
<variant> тетрациклин
<variant> гентамицин
<variant> эритромицин
<variant> ванкомицин
<question > Парентеральды АИТВ (адам иммунитет тапшылығының вирусы) зақымдануының постконтактілі алдын – алудың кеңейтілген режиміне ... тағайындайды.
<variant> зидовудин, ламивудин
<variant> ацикловир, ставудинді
<variant> индинавир, цефазолин және флуконазолды
<variant> ловастатин және зидовудинды
<variant> цефазолин және гентамицинді
<question > Арбидол ... вирустарға әсер етеді.
<variant> А және В тұмау
<variant> тек қана А тұмауы
<variant> тек қана В тұмауы
<variant> ұшық
<variant> цитомегаловирус
<question > Ацикловир ... қатынасында белсенділігі жоғары.
<variant> 1 және 2 түрі жай ұшық вирустарға
<variant> varicella zoster вирусқа
<variant> цитомегаловирусқа
<variant> адам иммунитет тапшылығының вирусына

<variant> тұмау вирусына
<question > Цефепимнің дозасы ересектерге... тең.
<variant> 0,5-1 г тәулігіне 2-3 ретке
<variant> 0,25-0,5 г тәулігіне 2 ретке
<variant> 1 г 1 ретке
<variant> 2 г тәулігіне 4-8 ретке
<variant> 0,5 г тәулігіне 3 ретке
<question > «Рикошет» синдромы фармакотерапияда бұл ... .
<variant> қандайда бір себептерден препарат эффектілігінің қарама-қарсы өзгеріп шығуы
<variant> ағзаның дәріні қабылдауға патологиялық сұранысы
<variant> препаратты қабылдауы аяқ астынан тоқтатса ағзаның тез нашарлауы
<variant> дәрінің ағзада жиналуы
<variant> тез метаболизмге ұшырауы салдарынан дәрінің әсерінің төмендеуі
<question > Емдеу процесіне дәрілік препараттың тиімді тобын таңдаудың негізгі қағидалары- ... .
<variant> қауіпсіздік, тиімділік, эффективтілік, бағасы
<variant> қауіпсіздік және бағасы
<variant> тиімділік және эффективтілік
<variant> бағасы және қауіпсіздік
<variant> эффективтілік және бағасы
<question > Антиретровирустық препараттар туралы дұрыс ұғым - ... .
<variant> препараттар вирустың көбеюін төмендеуіне ықпал етеді
<variant> препараттар жедел иммуннотапшылық синдромын жұқтырудың алдын алады
<variant> препараттар иммундық жүйені зақымданудан сақтамайды
<variant> препараттар жедел иммуннотапшылық синдромы толық емдемейді
<variant> препараттар вирустың көбеюіне ықпал етеді
<question > Вирустық препараттар – осельтамивир және занамивир... белсенді.
<variant> А және В тұмау вирусында
<variant> гепатит вирусында
<variant> С тұмау вирусында
<variant> герпес вирусында
<variant> цитомегаловирусында
<question > Альфа – интерферондарды... қолданудың негізгі клиникалық маңызы бар.
<variant> В, С және D гепатит вирусында
<variant> герпес вирусында
<variant> цитомегаловирустарда
<variant> саңырауқұлақ инфекциясында
<variant> тұмау вирусында
<question > Парентеральды АИТВ (адам иммунитет тапшылығының вирусы) зақымдануының постконтактілі алдын алуын .... бастау керек.
<variant> алғашқы минуттан 72 сағ дейін
<variant> 3 тәуліктен 10 тәулікке дейін
<variant> 1 ай
<variant> 1 жыл
<variant> алғашқы жарты жылда
<question > Парентеральды АИТВ (адам иммунитет тапшылығының вирусы) зақымдануының алдын – алу ... жүргізіледі.
<variant> 4 апта бойы
<variant> 8 апта
<variant> 2 күн бойы
<variant> 1 жыл
<variant> өмір бойы
<question> Кез келген шыққан ауырсынуды жояды. Эйфория, ұйқышылдық тудырады. Өкпенің вентиляциясын төмендетеді. Қарашықтардың тарылуын, ішкі мүшелердің тегіс бұлшықеттерінің

тонусының жоғарылауын. Жарақат кезінде аурсыну, операциядан кейінгі кезеңдегі ауырсыну, ішкі органдардың ауырсынуы үшін (миокард инфарктісі, қатерлі ісіктер) қолданылады. Қайталап қолдану есірткіге тәуелділікті тудырады. Бұл дәрінің аты....
<variant> морфин
<variant> анальгин
<variant> лидокаин
<variant> пенталгин
<variant> новокаин
<question> 19 жасар қыз, апельсинді ішкеннен кейін 15 минуттан кейін қабақтарының және еріндерінің ісінуіне, күйдіргіштікке, дауыстың қарлығуына шағымданады.Қарап тексергенде: беті паста тәрізді, еріндері, қабақтары ісінген, ыстық. пальпация кезінде ұстағанда. Клиникалық хаттамаларға сәйкес, шұғыл дәрі... .
<variant> преднизолон
<variant> лоратадин
<variant> беротек
<variant> эуфиллин
<variant> кетотифен
<question> Өкпе туберкулезімен ауыратын науқас ауыр халде ауруханаға жеткізілді. 1-ші қатардағы синтетикалық туберкулезге қарсы препаратты көктамыр ішіне енгізу интоксикация әсерін тез жояды. Бұл жағдайда қолданылатын препарат....болып табылады.
<variant> изониазид
<variant> допамин
<variant> дексаметазон
<variant> виндезин
<variant> кетотифен
<question> 6 жастағы науқаста паротит диагнозы қойылған, орташа ауыр түрі. Дене температурасы 39,20 С. Осы клиникалық жағдайда гипертермиялық синдромды тоқтату үшін ...тиімді.
<variant> парацетамол
<variant> ацетилсалицил қышқылы
<variant> диклофенак натрий
<variant> дифенгидрамин
<variant> натрий метамизолы
<question>Тетрациклиндер тобы препараттарының антацидтік дәрілермен бір мезгілде қолданғанда сіңуінің азаюы ... болып табылады.
<variant>фармакокинетикалық үйлесімсіздігі
<variant>препараттардың синергизмі
<variant>фармакодинамикалық үйлесімсіздігі
<variant>фармацевтикалық үйлесімсіздігі
<variant>препараттардың функционалдық антагонизмі
<question>Ревматизмі бар науқасқа глюкокортикоидтар тобынан препарат тағайындалды. Ең тиімді тағайындау ... .
<variant>преднизолон
<variant>дексаметазон
<variant>гидрокортизон
<variant>метилпреднизолон
<variant>триамцинолон
<question>Ревматизммен қанайналым жеткіліксіздігі бар науқасқа дәрілік зат тағайындалды. Бұл препаратқа ... жатады.
<variant>триамцинолон
<variant>дексаметазон
<variant>гидрокортизон
<variant>метилпреднизолон
<variant>бетаметазон

<question>52 жастағы науқас ревматоидты артритпен ұзақ уақыт ем қабылдап келеді. Метотрексат қабылдағаннан кейін 3 ай өткен соң, науқаста ауыз қуысында ойық жаралар, жүрек айну, шаш түсу, бауыр ферменттерінің жоғарылауы анықталды. Бұл жанама әсерлердің алдын алу үшін...бірге тағайындайды.
<variant> фолий қышқылын
<variant>С витаминін
<variant> омега-3 май қышқылдарын
<variant>темір сульфатын
<variant>аскорбин қышқылын
<question> Науқас 45 жаста, анамнезінде: жедел ревматикалық қызба. Дәрігер препаратты қайталама профилактика ретінде тағайындады. Бұл препарат…болып табылады.
<variant> бензилпенициллин
<variant> азитромицин
<variant> линкомицин
<variant> ванкомицин
<variant> гентамицин
<question> Ревматоидты артриті бар науқасқа глюкокортикоидтар тағайындалды. Препараттарды қабылдау аясында ... дамиды.
<variant>доғару синдромы
<variant> седативті синдром
<variant> абстиненттік синдром
<variant> рикошет синдромы
<variant> Иценко-Кушинг синдромы
<question> Ревматоидты артрит және он екі елі ішектің жара ауруы бар емделушіге стероидты емес қабынуға қарсы препаратты тағайындау қажет. Таңдау препараты ... болып табылады.
<variant> целекоксиб
<variant> ацетилсалицил қышқылы
<variant> парацетамол
<variant> анальгин
<variant> диклофенак-натрий
<question> Науқас ревматоидты артритпен ибупрофенмен емделді, бірақ буындардың ауруы мен ригидтік күшейе түсті. Дәрігер аурудың үдеуін баяулататын басқа препаратты тағайындады. Өкінішке орай, жанама әсерлер дамыды, оның ішінде бас айналу, құлақ шуы, көрудің нашарлауы және қышыну. Көзді тексеру кезінде мүйізді қабатының шөгінділері және тор қабығының шамалы пигменттері анықталады. Бұл ... препараты болып табылады.
<variant> алтын препараты
<variant> этанерцепт
<variant> гидроксихлорохин
<variant> метотрексат
<variant>иоридазин
<question> Ревматоидты артриті бар науқасқа қабынуға қарсы әсері бар препарат тағайындалды. Біраз уақыттан кейін науқаста суық тию, ісіну, жараның жазылмауына шағымдар пайда болды. Мұндай жанама әсерлерді тудырған препарат ... болып табылады.
<variant> целекоксиб
<variant> бутадион
<variant> преднизолон
<variant> аспирин
<variant> пироксикам
<question> Науқас 18 жаста, жедел ревматикалық қызба, кардит (митральды вальвулит), полиартрит, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі диагнозы бар стационарлық емдеуде. Патогенетикалық терапияға арналған препарат ... болып табылады.
<variant>преднизолон
<variant>метотрексат
<variant>варфарин

<variant>диклофенак
<variant>азитромицин
<question> Науқаста ревматоидты артрит диагностикаланған. Базистік терапия препараты ретінде метотрексат қабылдады. Жанама әсердің даму қаупін ... төмендетеді.
<variant>фолий қышқылы
<variant>алтын препараты
<variant>циклоспорин
<variant> ацетилсалицил қышқылы
<variant>аскорбин қышқылы
<question> Психозды емдеу үшін науқасқа экстрапирамидтік бұзылулар түрінде жанама әсері бар антипсихотикалық препарат тағайындалды. Препарат ... тобына жатады.
<variant> типтік нейролептиктер
<variant>антидепрессанттар
<variant>литий тұздар
<variant>анксиолитиктер
<variant>наркотикалық анальгетиктер
<question>Психозбен ауыратын науқасқа нейролептиктер тобынан препарат тағайындалды. Бұл препаратқа ... жатады.
<variant>хлорпротиксен
<variant>нитразепам
<variant>имипрамин
<variant>оксазепам
<variant>кетамин
<question>Науқасқа жеңіл анксиолитикалық (транквилизациялық) зат болып табылатын препарат тағайындалды. Бұл препаратқа ... жатады.
<variant>оксазепам
<variant>нитразепам
<variant> имипрамин
<variant>хлорпротиксен
<variant>кетамин
<question>Эпилепсиямен ауыратын науқасқа препарат тағайындалды. Бұл препаратқа … жатады
<variant>нитразепам
<variant>имипрамин
<variant>галоперидол
<variant>элениум
<variant>натрий оксибутираты
<question>Науқасқа нейролептикалық ең жоғары әсері бар препарат тағайындалды. Бұл препаратқа ... жатады.
<variant>хлорпротиксен
<variant>сульпирид
<variant>левомепромазин
<variant>галоперидол
<variant>клозапин
<question>Науқасқа психостимуляторлар тобынан препарат тағайындалды. Бұл препаратқа ... жатады.
<variant>сиднокарб
<variant>имипрамин
<variant>кетамин
<variant> пирацетам
<variant>женьшень тұндырмасы
<question>50 жастағы науқас күрделі жақ-бет хирургиялық операциясына дайындалды. Дәрігер ұзақ уақытқа әсер ететін анестезия үшін бупивакаин таңдады. Бірнеше минуттан соң бас айналу, ұйқышылдық, қимыл координациясының бұзылысы, сөйлеу қиындауы байқалды. Диагноз.. .
<variant> нейротоксикалық әсер
<variant> психогендік реакция

<variant> гипогликемия
<variant> аллергиялық реакция
<variant> жүрек-қантамыр жеткіліксіздігі
<question>Дәрігер төменгі азу тісті күрделі жұлу алдында анестезия жасады. Инъекциядан бірнеше секундтан кейін науқаста құлақ шулауы, бас айналу, қолдың дірілі, жүрек айну, сана шатасуы пайда болды. Біраздан соң бағдарынан жаңылып, сөйлеуі түсініксіз болды. Бұл асқыну.. .
<variant> Жүйелік уыттылық
<variant> Анафилактикалық реакция
<variant> Вазовагальды естен тану
<variant> Гипервентиляциялық синдром
<variant> Гипогликемия
<question> Алкоголь мен инсулинді бірге қабылдаудың салдарын анықтаңыз.
<variant > гипогликемияның дамуы
<variant > қант деңгейін көтеру
<variant> тәбеттің жоғалуы
<variant> глюкозаның сіңуін төмендету
<variant> жүрек айнуының пайда болуы
<question> Науқаста С., 85 жаста созылмалы пиелонефриттің асқынуымен антибактериалды препаратты қабылдау аясында тендовагинит клиникасы дамыды (сіңірдің қабынуы және үзілуі). Жанама әсерді тудырған препарат ... болып табылады .
<variant>ципрофлоксацин
<variant>кларитромицин
<variant>азитромицин
<variant>тикарциллин
<variant>цефуроксим
<question>Үрей сезіміне шағымданған депрессия сатысындағы маниакалды-депрессивті синдромы бар науқасқа қосымша психоседативті әсері бар антидепрессант тағайындалды. Бұл препарат ... болып табылады.
<variant> амитриптилин
<variant> имизин
<variant> ниаламидом
<variant> сиднофен
<variant> инказан
<question> Шизофрениямен ауыратын 38 жастағы науқас ұзақ уақыт бойы психотроптық дәрілермен емделді. Ол дәрігерге қозғалыс үйлесімінің бұзылуына, қолындағы треморға, ұйқышылдыққа шағымданды. Симптом кешені ... шақырылған.
<variant> нейролептиктермен
<variant> адаптогендермен
<variant> анальгетиктермен
<variant> антидепрессанттармен
<variant> психокоуаттандырғыштармен
<question>Қант диабетімен ауыратын науқаста имплант орнатқаннан кейін іріңді процесс дамыды. Антибиотикотерапия күткен нәтижені бермеді, инфекция өршуді жалғастырды. Себебі… .
<variant> инфекция ошағында тіндердің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы
<variant> антибиотикке аллергиялық реакция
<variant> имплантты орнату алдындағы стерильділіктің жеткіліксіздігі
<variant> операцияда қолданылған анестетиктерге гиперсезімталдық
<variant> антибиотик пен ауырсынуды басатын дәрілердің өзара әрекеттесуі
<question>Стоматолог операция алдында сілекей бөлінуін азайту үшін атропин енгізді. 30 минуттан кейін науқаста ауыздың құрғауы, қарашықтардың үлкеюі, терінің қызаруы, жүрек соғысының жиілеуі байқалды. Бұл симптомдардың ең ықтимал себебі.. .
<variant> антихолинергиялық синдром
<variant> аллергиялық реакция
<variant> анафилактикалық шок

<variant> серотониндік синдром
<variant> ортостатикалық гипотензия
<question> 18 жастағы науқас дәрігерге ұйқысыздыққа шағымданды. Нәтижесінде ол ұйықтамайды және келесі күні шаршағыштық сезеді, оқу материалын меңгеру қиындаған. Дәрігер ұйқысыздық неврозға ұқсас жағдайларға байланысты екенін анықтады. Таңдау препараты ... болып табылады.
<variant> нитразепам
<variant> этаминал-натрий
<variant> бромизовал
<variant> хлоралгидрат
<variant> фенобарбитал
<question> Неврозды емдеу үшін науқасқа үрей, қорқыныш сезімін төмендететін, ұйқының пайда болуына ықпал ететін, орталықты бұлшықет-босаңсытатын және тырысуға қарсы әсері бар препарат тағайындалды. Препарат ... тобына жатады.
<variant>анксиолитиктер
<variant>нейролептиктер
<variant>антидепрессанттар
<variant> литий тұздар
<variant>психостимуляторлар
<question>Неврозды емдеу үшін науқасқа диазепам тағайындалды. Препараттың әсер ету механизмі-... .
<variant>ГАМҚ-рецепторларды белсендіреді, бензодиазепинге байланыстырады
<variant>адренорецепторларды тежейді
<variant>адренорецепторларды белсендіреді
<variant>гистаминді рецепторларды белсендіреді
<variant>серотонин рецепторларын белсендіреді
<question>Созылмалы вирустық гепатитпен ауыратын науқасқа препарат тағайындалды. Бұл препаратқа ... жатады.
<variant>интерферон
<variant>ампициллин
<variant>холосас
<variant>папаверин
<variant>атропин
<question> Науқас М., 25 жаста, ми соққысымен клиникаға түсті. 2 айдан кейін – жалпы жағдайы қанағаттанарлық, бірақ науқаста есте сақтау, назар аудару, сөйлеу қабілеті бұзылған; бас айналу байқалады. Ми соққысынан кейінгі салдардың емі... болып табылады.
<variant> ноотропты препараттар (пирацетам, пиридоксин)
<variant> адренергиялық препараттар (добутамин, сальбутамол)
<variant> анксиолитиктер (лораазепам, гидроксизин)
<variant> нейролептиктер (сульпирид, дроперидол)
<variant> антибластомды препараттар (бусульфан, карбоплатин)
<question>Күрделі тісті жұлғаннан кейін науқаста қатты ауырсыну пайда болды. Оған анальгетик тағайындалды, бірақ бауыр функциясының бұзылуына байланысты оның метаболизмі баяулайды, бұл уыттылық қаупін арттырады. Бауырға жүктемені азайту үшін дәрігер ең қауіпсіз препаратты таңдайды. Таңдалған препарат... .
<variant> трамадол
<variant> парацетамол
<variant> кеторолак
<variant> морфин
<variant> нефопам
<question>Жүкті әйел жіті стрептококкты пневмониямен ауырған. Жүктілік кезінде антибактериалды дәрілерден...тиімді.
<variant>бензилпенициллин
<variant>стрептомицин
<variant>гентамицин
<variant>тетрациклин

<variant>ципрофлоксацин
<question>Ұзақ уақыт бойы созылмалы гепатитпен ауыратын ер адамға "пневмония"диагнозы қойылған. Осы клиникалық жағдайда антибактериалды дәрілік заттардан ... тиімді.
<variant>амоксициллин
<variant>тетрациклин
<variant>ванкомицин
<variant>рифампицин
<variant>бисептол
<question>6 жастағы бала пневмониямен ауырып, антибиотик тағайындалған. Емделгеннен кейін бала естуден айырылды. Антибиотиктердің қандай тобы бұл асқынуды тудыруы мүмкін?
<variant>Аминогликозидтер
<variant>Макролидтер
<variant>Табиғи пенициллиндер
<variant>Жартылай синтетикалық пенициллиндер
<variant>Цефалоспориндер
<question>Науқасқа бір мезгілде темір препараттары мен антацидті дәрілерді бірге қолдануға болмайтынын түсіндіріңіз:
<variant>темір препараттарының сіңуі нашарлайды
<variant>қан ақуыздарымен байланысуы артады
<variant>ағзада темірдің депонирленуі бұзылады
<variant>темір препараттарымен улану күшейтіледі
<variant>темір препараттарының элиминациясы тездейді
<question>Көптеген бейнаркотикалық анальгетиктер қабынуға қарсы және ыстықты түсіретін әсерге ие. Аталған препараттардың қайсысында қабынуға қарсы әсер жоқ?
<variant>парацетамол
<variant>индометацин
<variant>ацетилсалицил қышқылы
<variant>целекоксиб
<variant>ибупрофен
<question> Науқас, М. Соңғы 3 күнде мұрыннан шырышты бөлініске, мұрынның қышуына, түшкіруге, ұйқысының бұзылуына, көз жасының ағуына шағымдары. Үқсас жағдай 2 апта бұрын үй иелерінің мысығы болған қонақта болған. Қазіргі уақытта оның пәтерінде котят бар. Алдын ала диагноз: интермиттентті аллергиялық ринит. Клиникалық хаттамаларға сәйкес ... топтары тиімді болып табылады.
<variant> антигистаминді препараттар
<variant> цитостатиктер
<variant> кальций арналарының блокаторлары
<variant> аритмияға қарсы дәрілер
<variant> кортикостероидтар
<question>Респираторлық ауруы бар 10 жастағы балаға дене қызуын төмендету үшін парацетамол тағайындалды. Бұл емді фармакотерапияның қандай түріне жатқызу керек?
<variant>симптоматикалық
<variant>патогенетикалық
<variant>этиотропты
<variant>бейімделу
<variant>орынбасушы
<question>Спондилоартритпен ауыратын науқасқа дәрігер қабынуға қарсы стероидты емес препаратты – диклофенак-натрий тағайындады. Препараттың әсер ету механизмін көрсетіңіз:
<variant>ЦОГ-1 және ЦОГ-2 селективті емес тежегіші
<variant>фосфолипазаны тежеу А2
<variant>ЦОГ1 селективті тежеу
<variant>ЦОГ2 селективті тежеу
<variant>опиоидты рецепторлардың стимуляциясы

<question>Жүкті әйелге бронхитті емдеу үшін пенициллиндер тобының препараты тағайындалды. Осы топтағы препараттардың әсер ету механизмі қандай?
<variant>Микробтық жасуша қабырғасы синтезінің бұзылуы
<variant>Ақуыз синтезінің тежелуі
<variant>Жасушалық мембрананың өткізгіштігінің бұзылуы
<variant>Макроорганизм иммундық жүйесін белсендіру
<variant>Лейкоциттердің фагоцитарлық белсенділігінің жоғарылауы
<question>Диагностикалау мен емдеудің заманауи әдістері туралы сенімді мәлімет беретін мерзімдік ақпарат көздері :
<variant> ғылыми медициналық журналдар
<variant>оқулықтар
<variant> ғылыми мақалалар жинақтары
<variant>диссертациялық жұмыстар
<variant>әдістемелік нұсқаулар

БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ
Тест сұрақтарға арналған техникалық сипаттама
Пәні: Фармакотерапия
Пән коды: Fart 2219
ББ шифры мен атауы: 6В10106 «Фармация»
Оқу сағаты/кредит көлемі: 5/150
Оқу курсы мен семестрі: 2 курс, 4 семестр

Құрастырған: профессор м.а. Пернебекова Р.К.

Кафедра меңгерушісі: _ профессор м.а. Токсанбаева Ж.С.

Хаттама:

Тест тапсырмаларға техникалық сипаттама

№	Бағалау критериилері	Деңгейі			
		Өте жақсы	Жақсы	Қанағат-танарлық	Қанағат-танар-лықсыз
1	Фармакотерапия пәнінің анықтамасы және міндеттерін біледі. Дәрілердің фармакокинетикасы мен фармакодинамикасы туралы түсінікті меңгерген.	10	7,5	5	0
2	Дәрілік құралдардың фармакокинетикасы: дәрілерді ағзаға енгізудің жолдарын біледі.	10	7,5	5	0
3	Дәрілердің сіңірілуі: механизмі, сіңірілуге әсер ететін факторлары, биосіңімділікке, биоэквиваленттілікке анықтама бере алады.	10	7,5	5	0
4	Дәрілік заттардың ағзада таралуын, гистогематикалық кедергілер туралы түсінікті біледі.	10	7,5	5	0
5	Фармакодинамика сұрақтарын түсінеді және фармакодинамикалық параметрлерге анықтама бере алады.	10	7,5	5	0
6	Доза және оның түрлерін айта алады.	10	7,5	5	0
7	Дәрілік құралдарды қайталап қабылдағанда пайда болатын әсерлерді айта алады және сипаттама бере алады.	10	7,5	5	0

8	Дәрілердің әсерінің биоритмдерге тәуелділігін түсіндіре алады. Хронофармакология түсінігін меңгерген.	10	7,5	5	0
9	Дәрілердің әсерінің ағзаның жағдайына (жасы, жынысы, жеке ерекшеліктері және т.б.) байланысты екендігін түсіндіре алады..	10	7,5	5	0
10	Дәрілердің жанама әсерлерінің түрлерін біледі, түсіндіре алады.	10	7,5	5	0